

@Parastari98B

@Parastari98B

@Parastari98B

@Parastari98B

@Parastari98B

@Parastari98B

عوارض مصرف NSAID

ریسک فاکتورها

ثابت شده

- سن بالا
- سابقه زخم معده
- مصرف کورتون
- دوز بالا
- چندین NSAID با هم
- مصرف آنتی کواگولان

محتمل

- Hpylori
- سیگار
- الکل

تظاهرات

زخم معده یا دئودنوم

درمان زخم فعال

- قطع مصرف NSAID
- PPI یا H2 blocker
- در صورت مصرف PPI امکان ادامه دادن NSAID هم می باشد
- ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری

NSAID ها

- ناپروکسن
- ایبuprofen
- آسپرین
- دیکلوفناک
- ایندومتاسین
- ملوکسیکام
- سلکوکسیب
- مفنامیک اسید

عوارض کمتر

پیشگیری

- رژیم
 - میزوپروستول
 - PPI

در صورت نیاز به مصرف طولانی مدت

بررسی از نظر هلیکوباکتر پیلوری

اندیکاسیون

- خونریزی گوارشی قبلی
- مشکل زمینه ای گوارشی
- ریسک قلبی عروقی و مصرف آسپرین