



## پیام نوریها

public channel



کanal پیام نوریها در سال 95 با هدف تهییه جزوایت و نمونه سوالات افتتاح و از همان ابتدای تاسیس کوشیده است با تکیه بر تلاش بی وقه، کارگروهی و فعالیت های بدون چشمداشت کاربران متمایز خود، قدمی کوچک در راه پیشرفت ارائه خدمات به دانشجویان این مرز و بوم بردارد.

@Payamnoria

[telegram.me/Payamnoria](https://telegram.me/Payamnoria)

رایگان است و همیشه رایگان میماند



## اطلاع از اخبار و دانلود جزوات و نمونه سوالات

[برای ورود به کanal تلگرامی پیام نوریها کلیک کنید](#)

## "کanal و خانواده تلگرامی پیام نوریها "

با عضویت در کanal و به آرشیو زیر دسترسی پیدا کنید

✓ تمام نمونه سوالات به روز تا آخرین دوره

✓ جزوات درسی

✓ بیش از ۱۰۰ فلش کارت دروس

✓ اخبار به روز پیام نور

✓ فیلم و فایل آموشی اختصاصی

✓ انجام انتخاب واحد و حذف و اضافه

✓ پاسخگویی به سوالات دانشجویان

✓ معرفی گروه و انجمن های پیام نوری

✓ طنز و توبیت دانشجویی

به یکی از بزرگترین کanal های پیام نوری بپیونددید

[برای ورود به کanal تلگرامی پیام نوریها کلیک کنید](#)



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۸۰ تشریحی: ۰ کد آزمون 127077 سری سوال: یک ۱  
**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی (آموزش محور)، آسیب شناسی روانی با تکیه بر بافتار بوم شناسی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث رشته تحصیلی / **کد درس:** روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، رو انسناسی، روانشناسی عمومی، رو انسناسی ۱۲۱۷۰۸۰ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۴۳۳ -، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا ۱۲۱۷۵۶۸ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۵۹۷

**۱(۱۰۱) روش بروئر در درمان اختلالات روانی به چه روشی مشهور شد؟**

- (۱۰۱۰)۱ روش رفتاری (۱۰۱۰)۲ روش شناختی (۱۰۱۰)۳ روش روانکاوی (۱۰۱۰)۴ روش پالایشی

**۲(۱۰۱) این عبارت که آدمی می‌تواند بدون وساطت آگاهی تحت تاثیر یادگیری‌های قبلی قرار گیرد اشاره به چه نکته‌ای دارد؟**

- (۱۰۱۰)۱ حافظه آشکار (۱۰۱۰)۲ شناخت (۱۰۱۰)۳ حافظه تلویحی (۱۰۱۰)۴ آمنزی

**۳(۱۰۱) شایع ترین نوع تشخیص‌های روانی کدام دسته اختلالات‌اند؟**

- (۱۰۱۰)۱ اختلالات اضطرابی (۱۰۱۰)۲ اختلالات خلقی

- (۱۰۱۰)۳ وسوسات و اختلالات مرتبط (۱۰۱۰)۴ اختلالات شخصیت

**۴(۱۰۱) مطابق نظام DSM-5 برای تشخیص فوبی اختصاصی نشانگان اختلال چه مدت باید دوام یابند؟**

- (۱۰۱۰)۱ ۳ ماه (۱۰۱۰)۲ یکسال (۱۰۱۰)۳ ۱ ماه (۱۰۱۰)۴ ۶ ماه

**۵(۱۰۱) دگر سان بینی خود و دگرسان بینی محیط از نشانگان کدام اختلال است؟**

- (۱۰۱۰)۱ اختلال شخصیت ضد اجتماعی (۱۰۱۰)۲ آگروفوبی

- (۱۰۱۰)۳ اسکیزوفرنی (۱۰۱۰)۴ اختلال وحشت زدگی

**۶(۱۰۱) در خصوص اختلالات اضطرابی کدام عبارت صحیح است؟**

- (۱۰۱۰)۱ کارکرد ضعیف گابا در اضطراب نقش دارد. (۱۰۱۰)۲ افزایش سطح گابا در اضطراب نقش دارد.

- (۱۰۱۰)۳ سطح پایین نوراپی نفرین در اضطراب نقش دارد (۱۰۱۰)۴ سطح پایین نوراپی نفرین کوتیزول اضطراب ایجاد می‌کند.

**۷(۱۰۱) کدام صفت شخصیتی پیش‌بینی کننده قوی اختلال اضطراب اجتماعی است؟**

- (۱۰۱۰)۱ روان رنجورخویی (۱۰۱۰)۲ بازداری رفتاری (۱۰۱۰)۳ گشودگی (۱۰۱۰)۴ مسولیت‌پذیری

**۸(۱۰۱) منبع اصلی نوراپی نفرین در معز کدام ساختار است؟**

- (۱۰۱۰)۱ بادامه (۱۰۱۰)۲ هیپوکامپ (۱۰۱۰)۳ مخچه (۱۰۱۰)۴ لوكوس سرولوس

**۹(۱۰۱) در کدامیک از اختلالات اضطرابی درمان روان پویشی کارایی دارد؟**

- (۱۰۱۰)۱ اضطراب فراغیر (۱۰۱۰)۲ وحشت زدگی (۱۰۱۰)۳ آگورافوبی (۱۰۱۰)۴ تمامی موارد



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۸۰ تشریحی: ۰  
عنوان درس: آسیب شناسی روانی (آموزش محور)، آسیب شناسی روانی با تکیه بر بافتار بوم شناسی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، رو انسناسی، روانشناسی عمومی، رو انسناسی ۱۲۱۷۰۸۰ -، روانشناسی ۱۲۱۷۴۳۳ -، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا ۱۲۱۷۵۶۸ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۵۹۷

۱۰) عوامل اجتماعی- فرهنگی در کدام اختلال های مرتبط با وسوس نفیث بارزی دارد؟

- (۱۰۱۰)۱ اختلال بدریختی بدنی  
(۱۰۱۰)۲ اختلال استرس حاد  
(۱۰۱۰)۳ اختلال آگورافوبی

۱۱) کدام ساختارهای مغز در اختلال وسوس فعالیت غیر عادی دارند؟

- (۱۰۱۰)۱ قشرپیشین حدقه ای- هسته دمی- شکنج قدامی  
(۱۰۱۰)۲ قشرپیشین حدقه ای- تalamos- بادامه  
(۱۰۱۰)۳ هیپوکامپ- تalamos- بادامه

۱۲) رایج ترین داروی تجویز شده برای اختلال وسوس کدام داروست؟

- (۱۰۱۰)۱ کلومی پرامین  
(۱۰۱۰)۲ ریتالین  
(۱۰۱۰)۳ دیازپوکساید  
(۱۰۱۰)۴ هالوپریدول

۱۳) مطابق با تحقیقات در میان افراد با اختلال PTSD حجم ..... است

- (۱۰۱۰)۱ هیپوکامپ کاهش یافته  
(۱۰۱۰)۲ هیپوکامپ افزایش یافته  
(۱۰۱۰)۳ لیمبیک کاهش

۱۴) در DSM-5 تشخیص اختلال افسردگی اساسی مستلزم ..... نشانه و به مدت حداقل ..... است

- (۱۰۱۰)۱ ۶ نشانه و ۳ ماه  
(۱۰۱۰)۲ ۵ نشانه و دو هفته  
(۱۰۱۰)۳ ۸ نشانه و ۱ ماه  
(۱۰۱۰)۴ ۳ نشانه و ۳ ماه

۱۵) خلق افسرده در قسمت عمدہ روز و در بیش از نیمی از اوقات حداقل به مدت دو سال تشخیص کدام اختلال است؟

- (۱۰۱۰)۱ افسردگی پایدار  
(۱۰۱۰)۲ افسردگی عمدہ  
(۱۰۱۰)۳ دو قطبی  
(۱۰۱۰)۴ هیپومانی

۱۶) برای تشخیص اختلال ادواری خوبی نشانگان اختلال برای چه مدتی باید وجود داشته باشند؟

- (۱۰۱۰)۱ ۳ ماه  
(۱۰۱۰)۲ ۶ ماه  
(۱۰۱۰)۳ ۱ ماه  
(۱۰۱۰)۴ دو سال

۱۷) مطابق با بررسی های انجام شده روى دوقلوهای یک تخمکی ارثی بودن اختلال افسردگی عمدہ چند درصد است؟

- (۱۰۱۰)۱ ۵۰ درصد  
(۱۰۱۰)۲ ۲۰ درصد  
(۱۰۱۰)۳ ۳۷ درصد  
(۱۰۱۰)۴ ۱۰ درصد

۱۸) در پاسخ های هیجانی در افسردگی اساسی فعالیت هیپوکامپ ..... و فعالیت بادامه ..... می یابد.

- (۱۰۱۰)۱ افزایش - کاهش  
(۱۰۱۰)۲ کاهش- افزایش  
(۱۰۱۰)۳ افزایش --- افزایش  
(۱۰۱۰)۴ کاهش --- کاهش



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۸۰ تشریحی: ۰ کد آزمون 127077 سری سوال: ۱ یک عنوان درس: آسیب شناسی روانی (آموزش محور)، آسیب شناسی روانی با تکیه بر بافتار بوم شناسی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، رو انشناسی، روانشناسی عمومی، رو انشناسی ۱۲۱۷۰۸۰ -، روانشناسی ۱۲۱۷۴۳۳ -، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا ۱۲۱۷۵۶۸ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۵۹۷

(۱۰۱۰) نشانگان کوشینگ با افزایش ترشح مفرط کدام هورمون مرتبط است؟

- (۱۰۱۰)۱) سروتونین (۱۰۱۰)۲) کورتیزول (۱۰۱۰)۳) دوپامین (۱۰۱۰)۴) گابا

(۱۰۱۰)۲۰) حساسیت در برابر پاداش و محرومیت از خواب؛ پیش بینی کننده های کدام اختلال اند؟

- (۱۰۱۰)۱) افسردگی (۱۰۱۰)۲) اضطراب (۱۰۱۰)۳) اسکیزوفرنی (۱۰۱۰)۴) شیدایی

(۱۰۱۰)۲۱) مطابق با بررسی های انجام شده چند درصد اقدامات مربوط به خودکشی ناشی از وراثت پذیری است؟

- (۱۰۱۰)۱) ۴۸ درصد (۱۰۱۰)۲) ۲۰ درصد (۱۰۱۰)۳) ۷۰ درصد (۱۰۱۰)۴) ۱۵ درصد

(۱۰۱۰)۲۲) در کدام گزینه به نشانه های منفی اسکیزوفرنی اشاره شده است؟

- (۱۰۱۰)۱) هذیان- توهمندی (۱۰۱۰)۲) ناگویی- فقدان لذت- مردم گریزی

- (۱۰۱۰)۳) هذیان- مردم گریزی- گفتار درهم ریخته (۱۰۱۰)۴) توهمندی- هذیان - افت عاطفی

(۱۰۱۰)۲۳) طول دوره علایم در اختلال اسکیزوفرنی کوتاه مدت چقدر است؟

- (۱۰۱۰)۱) ۱ روز تا یک ماه (۱۰۱۰)۲) ۳ ماه (۱۰۱۰)۳) کمتر از ۶ ماه (۱۰۱۰)۴) یک هفته

(۱۰۱۰)۲۴) افزایش گیرنده ای دوپامینی با کدام دسته از نشانه های اسکیزوفرنی در ارتباطند؟

- (۱۰۱۰)۱) نشانه های مثبت (۱۰۱۰)۲) نشانه های منفی (۱۰۱۰)۳) افت عاطفی (۱۰۱۰)۴) انزواج اجتماعی

(۱۰۱۰)۲۵) عملکرد مختل بیماران اسکیزوفرنی در آزمون های عصب روانشناختی با تغییرات ساختاری در کدام مناطق مغزی مرتبط است؟

- (۱۰۱۰)۱) کوچکی بطن های مغز (۱۰۱۰)۲) بزرگی بطن های مغز

- (۱۰۱۰)۳) تحلیل منطقه پس سری (۱۰۱۰)۴) کوچکی هیپوکامپ

(۱۰۱۰)۲۶) عوارض برون هرمی ناشی از مصرف کدام دسته داروهاست؟

- (۱۰۱۰)۱) داروهای ضد اضطراب (۱۰۱۰)۲) داروهای ضد افسردگی

- (۱۰۱۰)۳) داروهای ضد روانپریشی (۱۰۱۰)۴) داروهای دوقطبی

(۱۰۱۰)۲۷) در کدام نوع زوال عقل، حافظه تخریب شدیدی پیدا نمی کند؟

- (۱۰۱۰)۱) زوال عقل پیشانی- گیجگاهی (۱۰۱۰)۲) زوال عقل عروقی

- (۱۰۱۰)۳) زوال عقل ناشی از صدمه (۱۰۱۰)۴) زوال عقل اجسام لوى



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۸۰ تشریحی: ۰ کد آزمون 127077 سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی (آموزش محور)، آسیب شناسی روانی با تکیه بر بافتار بوم شناسی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، رو انسناسی، روانشناسی عمومی، رو انسناسی ۱۲۱۷۰۸۰ -، روانشناسی ۱۲۱۷۴۳۳ -، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا ۱۲۱۷۵۶۸ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۵۹۷

۲۸) سطوح بالای کلسترول با احتمال وقوع کدام نوع زوال عقل مرتبط است؟

- (۱۰۱۰)۱) زوال عقل گیجگاهی  
(۱۰۱۰)۲) زوال عقل همراه اجسام لوى  
(۱۰۱۰)۳) زوال عقل همراه با صدمه  
(۱۰۱۰)۴) زوال عقل عروقی

۲۹) بی ثباتی در روابط بین فردی و همچنین تکانشوری بارز از نشانگان کدام اختلال شخصیت است؟

- (۱۰۱۰)۱) اسکیزوئید  
(۱۰۱۰)۲) مرزی  
(۱۰۱۰)۳) پارانویایی  
(۱۰۱۰)۴) اجتنابی

۳۰) برای تشخیص اختلا شخصیت ضد اجتماعی ، سن دست کم باید چند سال باشد؟

- (۱۰۱۰)۱) ۱۰ سال  
(۱۰۱۰)۲) ۱۵ سال  
(۱۰۱۰)۳) ۲۰ سال  
(۱۰۱۰)۴) ۱۸ سال

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	د	عادی
2	ج	عادی
3	الف	عادی
4	د	عادی
5	د	عادی
6	الف	عادی
7	ب	عادی
8	د	عادی
9	ب	عادی
10	ب	عادی
11	الف	عادی
12	الف	عادی
13	الف	عادی
14	ب	عادی
15	الف	عادی
16	د	عادی
17	ج	عادی
18	ب	عادی
19	ب	عادی
20	د	عادی
21	الف	عادی
22	ب	عادی
23	الف	عادی
24	الف	عادی
25	ب	عادی

عادی	د	26
عادی	الف	27
عادی	د	28
عادی	ب	29
عادی	د	30

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی (آموزش محور)، آسیب شناسی روانی با تکیه بر بافتار بوم شناسی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، روشناسی، روانشناسی عمومی، روشناسی ۱۲۱۷۰۸۰ -، روانشناسی ۱۲۱۷۴۳۳ -، روانشناسی ۱۲۱۷۵۹۷ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۵۶۸ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۵۹۷

- اشکال در حفظ روابط سازنده با دیگران ویژگی اصلی کدام گروه از اختلالات می باشد؟

۴. جنسی

۳. شخصیت

۲. اضطرابی

۱. خلقی

- علاقه ناچیز به روابط جنسی در کدام اختلال شخصیت دیده می شود؟

۴. خودشیفت

۳. دوری گرین

۲. اسکیزوئید

۱. نمایشی

- در کدام اختلال شخصیت، در هنگام تجربه فشار روانی افکار پارانویایی و علائم گستاخی دیده می شود؟

۴. مرزی

۳. ضداجتماعی

۲. اسکیزوئید

۱. پارانوئید

- در کدام اختلال شخصیت تلقین پذیری بالاست؟

۴. وابسته

۳. نمایشی

۲. وسواسی جبری

۱. پارانوئید

- بی ثباتی در خودپنداره ویژگی کدام اختلال شخصیت می باشد؟

۴. مرزی

۳. اسکیزووتایپی

۲. خودشیفت

۱. نمایشی

- تیرگی شعور معمولا در کدام حالت مرضی وجود دارد؟

۴. روان رنجوری

۳. روان پریشی

۲. دلیریوم

۱. دمانس

- کدام حالت روانشناختی مرضی برگشت ناپذیر است؟

۴. افسردگی

۳. آمنزی

۲. دلیریوم

۱. دمانس

- چرخه پاسخ جنسی انسان از چند مرحله تشکیل شده است؟

۴. پنج

۳. چهار

۲. سه

۱. دو

- حداقل معیار زمانی برای تشخیص اختلال نعوظی در مردان کدام است؟

۴. یک سال

۳. شش ماه

۲. سه ماه

۱. یک ماه

- تحریک جنسی از قسمت غیرتناسلی بدن و اشیای بی جان در کدام انحراف جنسی دیده می شود؟

۴. مالش گری

۳. عورت نمایی

۲. یادگارپرستی

۱. تماشاگری

- ناگویی جزء کدام نشانه های اسکیزووفرنی است؟

۴. شناختی

۳. درهم ریخته

۲. منفی

۱. مثبت

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی (آموزش محور)، آسیب شناسی روانی با تکیه بر بافتار بوم شناسی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، روشناسی، روانشناسی عمومی، روشناسی ۱۲۱۷۰۸۰ -، روانشناسی ۱۲۱۷۴۳۳ -، روانشناسی ۱۲۱۷۵۹۷ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۵۶۸ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۵۹۷

۴. هذیان

۳. گفتار درهم ریخته

۲. فقدان لذت

۱. مردم گریزی

۱۲- دوره حاد اسکیزوفرنی معمولاً با کدام نشانه همراه است؟

۴. اجتماعی

۳. حرکتی

۲. شناختی

۱. عاطفی

۱۳- انعطاف پذیری مومی شکل جزء کدام نشانه های اسکیزوفرنی است؟

۲. بین یک روز تا یک ماه

۴. بیشتر از شش ماه

۱. بین یک ماه تا شش ماه

۳. بین سه ماه تا یک سال

۱۴- نشانه ها در اختلال اسکیزوفرنی شکل در چه بازه زمانی تجربه می شوند؟

۴. گفتار درهم ریخته

۳. ناگویی

۲. توهمند

۱. بی ارادگی

۱۵- داروهای موثر بر گیرنده های دوپامینی در درجه اول روی کدام نشانه اسکیزوفرنی تاثیر می گذارد؟

۴. استئیل کولین

۳. اپی نفرین

۲. سروتونین

۱. گابا

۱۶- داروهای ضد روان پریشی نسل دوم روی کدام انتقال دهنده عصبی موثر هستند؟

۴. اضطراب فراگیر

۳. وسواس فکری عملی

۲. فوبی اختصاصی

۱. وحشت زدگی

۱۷- کدام اختلال اضطرابی قبلی، در ردیف اختلالات اضطرابی طبقه بندی نمی شود؟

۴. اضطراب اجتماعی

۳. وحشت زدگی

۲. اضطراب فراگیر

۱. فوبی اختصاصی

۱۸- دگرسان بینی خود و محیط در کدام اختلال اضطرابی تجربه می شود؟

۴. اضطراب اجتماعی

۳. وحشت زدگی

۲. اضطراب فراگیر

۱. فوبی اختصاصی

۱۹- مهمترین علامت اختلال اضطراب فراگیر کدام است؟

۴. تپش قلب بالا

۳. اجتناب

۲. نگرانی

۱. ترس

۲۰- اولین عامل در نظریه دو عاملی ماورر کدام است؟

۴. شرطی شدن کنشنگر

۳. شرطی شدن جانشینی

۱. شرطی شدن کلاسیک

۳. شرطی شدن جانشینی

۲۱- کدام صفت شخصیتی با اختلالات اضطرابی ارتباط دارد؟

۴. برون گرایی

۳. روان رنجورخوبی

۲. انعطاف پذیری

۱. روان پریشی گرایی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی (آموزش محور)، آسیب شناسی روانی با تکیه بر بافتار بوم شناسی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، رو اشناسی، روانشناسی عمومی، رو اشناسی ۱۲۱۷۰۸۰ -، روانشناسی ۱۲۱۷۴۳۳ -، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا ۱۲۱۷۵۶۸ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۵۹۷

-۲۲- شرطی شدن احساسی در تبیین کدام اختلال اضطرابی کاربرد دارد؟

۱. اضطراب فراگیر      ۲. وحشت زدگی      ۳. وسوس فکری عملی      ۴. فوبی اختصاصی

-۲۳- سهم وراثت در سبب شناسی OCD چقدر است؟

۱. بالا      ۲. متوسط      ۳. کم      ۴. بسیار کم

-۲۴- گسترده ترین درمان روانشنختی برای اختلال وسواسی اجباری کدام است؟

۱. روانکاوی      ۲. مراجع محور      ۳. مواجهه و پیشگیری از پاسخ      ۴. درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش

-۲۵- کدام اختلال خلقی در DSM-5 بعنوان یک اختلال جدید وارد شده است؟

۱. دوقطبی II      ۲. اختلال بی نظمی خلق ایذایی      ۳. ادواری خوبی      ۴. اختلال خلقی ناشی از مواد

-۲۶- اگر پنج نشانه افسردگی به مدت حداقل دو هفته دوام داشته باشد، کدام تشخیص اختلال خلقی گذاشته می شود؟

۱. افسردگی خوبی      ۲. افسردگی ایذایی      ۳. اختلال بی نظمی خلق ایذایی      ۴. ادواری خوبی

-۲۷- در دوره هیپومانی نشانه های خفیف، حداقل چند روز دوام دارند؟

۱. ۴      ۲. ۷      ۳. ۱۴      ۴. ۳۰

-۲۸- روان درمانی بین فردی معمولا در درمان کدام اختلال کاربرد دارد؟

۱. افسردگی      ۲. شخصیت      ۳. اسکیزوفرنی      ۴. اضطراب فراگیر

-۲۹- از تکلیف استروپ برای بررسی کدام متغیر روانشنختی استفاده می شود؟

۱. خلق      ۲. توجه      ۳. اضطراب      ۴. تداعی

-۳۰- مطابق دیدگاه فروید، ایگو از کجا منشا می گیرد؟

۱. مستقل است      ۲. نهاد      ۳. فراخود      ۴. جامعه

وضعیت کلید	پاسخ صحیح	شمارہ سوال
عادی	ج	1
عادی	ب	2
عادی	د	3
عادی	ج	4
عادی	د	5
عادی	ب	6
عادی	الف	7
عادی	ج	8
عادی	ج	9
عادی	ب	10
عادی	ب	11
عادی	د	12
عادی	ج	13
عادی	الف	14
عادی	ب	15
عادی	ب	16
عادی	ج	17
عادی	ج	18
عادی	ب	19
عادی	الف	20
عادی	د	21
عادی	ب	22
عادی	ب	23
عادی	ج	24
عادی	ب	25
عادی	ب	26
عادی	الف	27
عادی	الف	28
عادی	ب	29



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی (آموزش محور)، آسیب شناسی روانی با تکیه بر بافتار بوم شناسی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، روانشناسی عمومی، رو انسناسی ۱۲۱۷۰۸۰ -، رو انسناسی، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۴۳۳ روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا ۱۲۱۷۵۶۸ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۵۹۷.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی (آموزش محور)، آسیب شناسی روانی با تکیه بر بافتار بوم شناسی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، روانشناسی عمومی، رو انشناسی ۱۲۱۷۰۸۰ - رو انشناسی، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۴۳۳ - روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا ۱۲۱۷۵۶۸ - روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۵۹۷

- ۸- کدام یک از اختلال های زیر شامل وجود ترس شدید و غیرعادی می شوند؟

- ۱. فوبی اختصاصی
- ۲. اختلال های اضطرابی
- ۳. اختلال وحشت زدگی
- ۴. اختلال اضطراب اجتماعی

- ۹- کدام یک از داروهای زیر ازسوی وزارت مواد غذایی دارویی (FDA) تاییدیه استفاده در اختلال اضطراب فraigیر را دریافت کرده است؟

- ۱. بوسپیرون
- ۲. بنزو دیازپین
- ۳. زاناکس
- ۴. سرتالین

- ۱۰- کدام رویکرد، مفیدترین رویکرد برای بسیاری از اختلال های اضطرابی محسوب می شود؟

- ۱. مواجهه
- ۲. حساسیت زدایی منظم
- ۳. رفتار درمانی شناختی
- ۴. آرمیدگی و رویکرد شناختی

- ۱۱- در میان زنانی که در پی جراحی پلاستیک هستند، حدود ۵ تا ۷ درصد با ملاکهای تشخیصی این اختلال جور در می آیند این اختلال کدام است؟

- ۱. بدشکلی بدن
- ۲. وسواس فکری عملی
- ۳. افسردگی
- ۴. اضطراب

- ۱۲- در میان کسانی که تشخیص احتکار می گیرند کدام یک از اختلال های زیر شایع نیست؟

- ۱. افسردگی
- ۲. اختلال اضطراب فraigir
- ۳. وسواس فکری عملی
- ۴. هراس اجتماعی

- ۱۳- واکنش های گسستی (بازگشت به گذشته) در کدام یک از اختلال های زیر دیده می شود؟

- ۱. اختلال فشار روانی پس آسیبی (PTSD)
- ۲. اختلال فشار روانی حاد (ASD)
- ۳. اختلال های اضطرابی
- ۴. وسواس فکری عملی (OCD)

- ۱۴- نشانه های بدخلقی مکرر شدید و خلق منفی پایدار به مدت دست کم یک سال با شروع قبل از ده سالگی در کدام اختلال دیده می شود؟

- ۱. افسردگی اساسی
- ۲. دو قطبی
- ۳. بی نظمی خلق ایذایی
- ۴. ادواری خوبی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی (آموزش محور)، آسیب شناسی روانی با تکیه بر بافتار بوم شناسی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، روانشناسی عمومی، رو انشناسی ۱۲۱۷۰۸۰ -، رو انشناسی، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۴۳۳ -، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا ۱۲۱۷۵۶۸ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۵۹۷ -،

OCD . ۴

BDD . ۳

PTSD . ۲

MDD . ۱

- ۱۵- کدام یک از اختلال های زیر شایع ترین اختلال های روانی است؟

- ۱۶- کدام انتقال دهنده عصبی نقش مهمی در میزان حساسیت دستگاه پاداش در مغز ایفا می کند؟

۴. گابا

۳. نورایی نفرین

۲. دوپامین

۱. سروتونین

- ۱۷- مهم ترین راه انداز افسردگی چیست؟

۴. نومیدی

۳. خلق پایین

۲. بی انگیزگی

۱. خودسرزنشی

- ۱۸- نرخ سوء مصرف مواد در کدام اختلال زیر بالا است؟

۴. اضطراب اجتماعی

۳. احتکار

۲. اسکیزوفرنی

۱. افسردگی

- ۱۹- کدام یک از موارد زیر از نشانه های منفی اسکیزوفرنی نیست؟

۴. فقدان لذت

۳. توهمن

۲. مردم گریزی

۱. بی ارادگی

- ۲۰- افراد مبتلا به اسکیزوفرنی نرخ متابولیکی کمتری را در کدام قشر مغز از خود نشان دادند؟

۴. قشر گیجگاهی

۳. قشر پس سری

۲. قشر آهیانه ای

۱. قشر پس سری

- ۲۱- علاقه یا میل جنسی که غالبا با تخیلات یا افکار تحریک کننده جنسی همراهند در کدام مرحله از چرخه پاسخ جنسی کاپلان قرار دارد؟

۴. فرونژینی (حل)

۳. اوج (ارگاسم)

۲. تهییج

۱. میل

- ۲۲- درد مداوم یا بازپیدا درهنگام آمیزش جنسی را چه می نامند؟

۲. درد جنسی (تناسلی)

۱. درد دخول

۴. درد لگنی

۳. درد مهبلی

- ۲۳- سلامت هیجانی مطلوب جز کدام یک از عوامل پیش بینی کننده های کارکرد جنسی است؟

۲. عوامل جسمی

۱. عوامل زیستی

۴. عوامل اجتماعی و جنسی

۳. عوامل روان شناختی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی (آموزش محور)، آسیب شناسی روانی با تکیه بر بافتار بوم شناسی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، روانشناسی عمومی، رو انشناسی ۱۲۱۷۰۸۰ -، رو انشناسی، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۴۳۳ -، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا ۱۲۱۷۵۶۸ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۵۹۷ -،

- ۴۴- کدام نوع از رویکردهای درمانی برای بهبود بسیاری از جنبه های کارکرد جنسی به کار می رود؟

۲. درمان راه حل محور

۱. روایت درمانی

۴. درمان متکی بر احساسات (EFT)

۳. زوج درمانی رفتاری

- ۴۵- افراد کهنسال در برابر کدامیک از اختلال های زیر بسیار آسیب پذیر هستند؟

۴. زوال عقل و آلزایمر

۳. پارکینسون و دلیریوم

۲. زوال عقل و دلیریوم

۱. پارکینسون و آلزایمر

- ۴۶- به علائم آغازین افول که قبل از تخریب کارکردی شناسایی می شوند چه می گویند؟

۲. افت شناختی

۱. تخریب شناختی خفیف

۴. کاستی های شناختی

۳. نارسایی شناختی

- ۴۷- گم گشتگی (فقدان جهت یابی) در کدام بیماری نمود می یابد؟

۴. آلزایمر

۳. زوال عقل

۲. دلیریوم

۱. پارکینسون

- ۴۸- بریدن از روابط اجتماعی، گستره محدود ابراز احساسات از ویژگی های کلیدی کدام اختلال شخصیت است؟

۴. اسکیزوپریو

۳. وسوسی

۲. اسکیزووتاپی

۱. اجتنابی

- ۴۹- کدام مشخصه اسکیزوفرنی در اسکیزوفرنیای پارانویید دیده نمیشود؟

۲. درهم ریختگی شناختی

۱. توهمندی

۴. بدینی

۳. هذیان

- ۵۰- اشخاص مبتلا به این اختلال در محیطی پرورش یافته اند که والدین از رفتار جنسی به عنوان موضوعی کثیف سخن می رانده اند و در همان حال، به گونه ای رفتار می کردند که گویی این رفتارهای جنسی موردی تحریک کننده و مطلوب اند این عبارت بیانگر کدام اختلال زیر است؟

۲. اختلال شخصیت اجتنابی

۱. اختلال شخصیت مرزی

۴. اختلال شخصیت اسکیزوئید

۳. اختلال شخصیت هیستریونیک

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	ج	عادی
2	د	عادی
3	ج	عادی
4	الف	عادی
5	ج	عادی
6	ب	عادی
7	د	عادی
8	ب	عادی
9	الف	عادی
10	ج	عادی
11	الف	عادی
12	ج	عادی
13	ب	حذف با تأثیر مثبت
14	ج	عادی
15	الف	عادی
16	ب	عادی
17	د	عادی
18	ب	عادی
19	ج	عادی
20	الف	حذف با تأثیر مثبت
21	الف	عادی
22	ب	عادی
23	ج	عادی
24	د	عادی
25	ب	عادی
26	الف	عادی
27	د	عادی
28	د	عادی
29	ب	عادی
30	ج	عادی

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی (آموزش محور)، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی و شهه تحصیلی / کد درس: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا ۱۲۱۷۰۸۰ -، روانشناسی عمومی، رو انسناسی ۱۲۱۷۴۳۳ -، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا ۱۲۱۷۵۶۸۱ -

۱- آخرین قسمت روان در نظریه فروید کدام است؟

۱. نهاد      ۲. من برتر      ۳. هشیاری      ۴. انتقال متقابل

۲- وقتی بیمار تلاش می کند با درمانگرش ارتباط عاطفی داشته باشد، کدام پدیده روانکاوی اتفاق می افتد؟

۱. تداعی آزاد      ۲. انتقال      ۳. واپس روی      ۴. انتقال متقابل

۳- وقتی فرد دارای تکانه های جنسی نسبت به کودکان، با بهره کشی جنسی از کودکان مبارزه می کند، نقش کدام مکانیزم دفاعی بر جسته می شود؟

۱. دلیل تراشی      ۲. والایش      ۳. انکار      ۴. واکنش وارونه

۴- در کدام پارادایم بر اهمیت مواجهه در درمان اختلالات روانی تاکید می شود؟

۱. انسان گرایی      ۲. رفتاری      ۳. شناختی      ۴. روانکاوی

۵- تکلیف استریوپ بر اساس کدام رویکرد ساخته شده است؟

۱. شناختی      ۲. روانکاوی      ۳. پدیدارشناسی      ۴. رفتاری

۶- مطابق DSM-5 کدام اختلال جزء اختلالات اضطرابی محسوب نمی شود؟

۱. آگورافوبی      ۲. وحشت زدگی      ۳. وسواس فکری عملی      ۴. اضطراب فرگیر

۷- شایع ترین تشخیص اختلالات روانی کدامند؟

۱. اختلالات خلقی      ۲. اختلالات اضطرابی      ۳. اختلالات طیف اسکیزوفرنیا      ۴. اختلالات شبه جسمی

۸- برای تشخیص دوره شیدایی، نشانه ها باید چه مدت دوام داشته باشند؟

۱. چهار روز      ۲. یک هفته      ۳. دو هفته      ۴. شش ماه

۹- پرس افکار در کدام اختلال دیده می شود؟

۱. افسردگی اساسی      ۲. وسواس فکری عملی      ۳. دو قطبی      ۴. شخصیت

۱۰- افسردگی در کدام اختلال دوام طولانی تری دارد؟

۱. افسردگی اساسی      ۲. افسردگی فصلی      ۳. افسردگی خویی      ۴. اسکیزوافکتیو

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی (آموزش محور)، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی و شهه تحصیلی / کد درس: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا ۱۲۱۷۰۸۰ -، روانشناسی عمومی، رو انسناسی ۱۲۱۷۴۳۳ -، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا ۱۲۱۷۵۶۸۱

۱۱- کدام انتقال دهنده عصبی در حساسیت نسبت به پاداش نقش دارد؟

۴. دوپامین

۳. نوراپی نفرین

۲. گابا

۱. سروتونین

۱۲- تحت استرس کدام هورن در بدن ترشح می شود؟

۴. نورآدرنالین

۳. کورتیزول

۲. آدرنالین

۱. تستوسترون

۱۳- گرایش به تجربه عواطف منفی در کدام صفت شخصیتی وجود دارد؟

۴. درون گرایی

۳. روان پریشی گرایی

۲. برون گرایی

۱. روان رنجورخویی

۱۴- گرایش به اندیشه پردازی مکرر در خصوص تجارب و افکار اشاره به کدام مفهوم دارد؟

۴. سبك اسنادي

۳. خطای شناختی

۲. نشخوار فکري

۱. وسواس فكري

۱۵- درمان مبتنی بر فعال سازی رفتاری بر اساس کدام نظریه ارائه شده است؟

۴. یانگ

۳. واتسون

۲. سالیوان

۱. بک

۱۶- کدام روش درمانی افسردگی را محصول سطوح پایین تقویت مثبت می داند؟

۲. درمان مبتنی بر فعال سازی رفتاری

۱. رواندرمانی بین فردی

۴. درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش

۳. درمان مبتنی بر ذهن آگاهی

۱۷- فرضیه ترس از ترس در ارتباط با کدام اختلال اضطرابی ارائه شده است؟

۴. آگورافوبی

۳. فوبی اجتماعی

۲. فوبی خاص

۱. اضطراب فراغیر

۱۸- شرطی شدن احساسی در تبیین اختلال وحشت زدگی مبتنی بر کدام نوع از شرطی شدن است؟

۴. وسیله ای

۳. کلاسیک

۲. مشاهده ای

۱. عامل

۱۹- کدام نشانه های مثبت اسکیزوفرنی است؟

۴. مردم گریزی

۳. آشفتگی های ادراکی

۲. فقدان لذت

۱. افت عاطفی

۴. چشایی

۳. بویایی

۲. دیداری

۱. شنیداری

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی (آموزش محور)، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی و شهه تحصیلی / کد درس: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا ۱۲۱۷۰۸۰ -، روانشناسی عمومی، رو انسناسی ۱۲۱۷۴۳۳ -، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا ۱۲۱۷۵۶۸۱ -

**- ۲۱- مطابق DSM-5 کدام اختلال جزء پیوستار اسکیزوفرنی محسوب نمی شود؟**

۱. هذیانی      ۲. اسکیزوافکتیو      ۳. اسکیزوفرنی شکل      ۴. اسکیزوتاپیال

**- ۲۲- مصرف کدام مواد حالت هایی شبیه به اسکیزوفرنی ایجاد می کند؟**

۱. الکل      ۲. آمفاتامین      ۳. هروین      ۴. بنزودیازپین

**- ۲۳- عوارض برون هرمی در درمان دارویی کدام اختلال روانی ایجاد می شود؟**

۱. وسواس فکری عملی      ۲. اسکیزوفرنی      ۳. افسردگی اساسی      ۴. دوقطبی

**- ۲۴- مطابق ملاک های DSM-5 حداقل دوره زمانی برای تشخیص اختلال میل جنسی کم کار چقدر است؟**

۱. یک ماه      ۲. سه ماه      ۳. شش ماه      ۴. یک سال

**- ۲۵- کدام اختلال جزء بدکارکردی های جنسی محسوب نمی شود؟**

۱. اختلال عورت نمایی      ۲. اختلال درد جنسی      ۳. اختلال برانگیختگی جنسی      ۴. اختلال میل جنسی کم کار

**- ۲۶- درمان های انزجاری برای درمان کدام اختلال جنسی می تواند مفید باشد؟**

۱. اختلال انزال زودرس      ۲. اختلال ارگاسمی      ۳. اختلال درد جنسی      ۴. اختلال یادگار پرستی

**- ۲۷- کدام اختلال در سنین پیری دیده می شود؟**

۱. اسکیزوفرنی      ۲. افسردگی اساسی      ۳. زوال عقل      ۴. شخصیت

**- ۲۸- کدام اختلال شخصیت در خوش ب قرار نمی گیرد؟**

۱. اجتنابی      ۲. مرزی      ۳. نمایشی      ۴. جامعه ستیز

**- ۲۹- بی تفاوتی نسبت به تحسین در کدام اختلال شخصیت دیده می شود؟**

۱. پارانویید      ۲. مرزی      ۳. نمایشی      ۴. اسکیزووید

**- ۳۰- تکانشوری و بی ثباتی در روابط و خلق از ویژگی های کدام اختلال شخصیت می باشد؟**

۱. اسکیزوتاپی      ۲. مرزی      ۳. اجتنابی      ۴. خودشیفته

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	ج	عادی
2	ب	عادی
3	د	عادی
4	ب	عادی
5	الف	عادی
6	ج	عادی
7	ج	عادی
8	ب	عادی
9	ج	عادی
10	ج	عادی
11	د	عادی
12	ج	عادی
13	الف	عادی
14	ب	عادی
15	الف	عادی
16	ب	عادی
17	د	عادی
18	ج	عادی
19	ج	عادی
20	الف	عادی
21	د	عادی
22	ب	عادی
23	ب	عادی
24	ج	عادی
25	الف	عادی
26	د	عادی
27	ج	عادی
28	الف	عادی
29	د	عادی
30	ب	عادی

00-01-2



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشته تحصیلی/کد درس:** روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۴۳۳ - ۱۲۱۷۰۸۰

- حمله ناگهانی ترس، وحشت و احساس مرگ قریب الوقوع که با نشانه های بدنی مثل مور مور شدن، تنگی نفس و احساس ضعف همراه است، مربوط به کدام اختلال می باشد؟

- ۱. اختلال وحشتزدگی
- ۲. اختلال آگورا فوبی
- ۳. اختلال اضطراب فراگیر
- ۴. اختلال فوبی

- تکلیف استروپ برای بررسی کدام عملکرد به کار می رود؟

- ۱. حافظه تلویحی
- ۲. ناهشیاری
- ۳. توجه
- ۴. بازسازی شناختی

- احیای یک ضایعه عاطفی قبلی و رهاسازی تنش هیجانی ناشی از افکار فراموش شده یک رویداد، روش ابداعی چه کسی بود؟

- ۱. فروید
- ۲. بروئر
- ۳. شارکو
- ۴. یونگ

- "نحوه سازمان دهی تجربیات فرد، معناده‌ی و پیوند دادن تجربه فعلی با تجربه ذخیره شده در حافظه" چه نام دارد؟

- ۱. شناخت
- ۲. طرحواره
- ۳. آمایه شناختی
- ۴. پارادایم شناختی

- وقتی فرد متوجه علائم بدنی اضطراب می شود و به دنبال آن، اولین حمله وحشت زدگی رخ می دهد، بعد حملات وحشتزدگی تبدیل به یک پاسخ شرطی در برابر تغییرات بدنی می شود" این وضعیت چه نام دارد؟

- ۱. شرطی شدن کلاسیک
- ۲. شرطی شدن احشایی
- ۳. شرطی شدن کنشگر
- ۴. شرطی شدن عامل

- کدام ساختار و انتقال دهنده عصبی، اهمیت ویژه ای در اختلال وحشت زدگی دارد؟

- ۱. بادامه-نوراپی نفرین
- ۲. لوکوس سرولوس- نوراپی نفرین
- ۳. قطعه قدمی پیشانی- دوپامین
- ۴. هیپوکامپ- دوپامین

- این تصور که وحشت شدید باعث شده تا روح از بدن جدا شود، مربوط به کدام نشانگان است؟

- ۱. شن کویی
- ۲. سوستو
- ۳. کورو
- ۴. تای جین کیوفوشو

- گسترده ترین درمان روانشناختی که برای اختلال وسوسی-اجباری به کار می رود، کدام است؟

- ۱. مواجهه پیشگیری از پاسخ
- ۲. درمان شناختی-رفتاری
- ۳. دارو درمانی
- ۴. فعال سازی رفتاری

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشته تحصیلی / کد درس:** روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

۹- "وارسی سر و وضع خویش در برابر آیینه، مقایسه ظاهر خویش با دیگران، نظرخواهی از دیگران درباره سر و وضع خود" در کدام اختلال دیده می شود؟

- ۱. اختلال فشار روانی پس آسیبی
- ۲. اختلال احتکار
- ۳. اختلال وسوسات فکری-عملی
- ۴. اختلال بدريختی بدن

۱۰- رایج ترین داروی ضدافسردگی تجویزی برای OCD کدام است؟

- ۱. کلومی پرامین
- ۲. پاروکستین
- ۳. فلوکستین
- ۴. سرتالین

۱۱- کدام گزینه درباره هیپومانی صحیح است؟

- ۱. نشانه ها یک هفته دوام می یابند.
- ۲. افزایش فعالیت یا انرژی در حد قابل توجه نسبت به خط پایه تغییر می کند.
- ۳. نشانه ها حداقل ۴ روز تداوم دارند.
- ۴. نشانه های روان پریشی دیده می شوند.

۱۲- در نشانگان کوشینگ و همچنین به هنگام بروز افسردگی، کدام عامل مشاهده می شود؟

- ۱. ترشح مفرط دوپامین
- ۲. ترشح مفرط سروتونین
- ۳. ترشح مفرط کورتیزول
- ۴. ترشح مفرط نوراپی نفرین

۱۳- کدامیک از عوامل زیر، افزایش نشانه های شیدایی را در اختلال دوقطبی پیش بینی می کند؟

- ۱. عدم حمایت اجتماعی
- ۲. روان رنجورخویی
- ۳. هیجان ابراز شده
- ۴. محرومیت از خواب

۱۴- کدام درمان متکی بر این عقیده است که بسیاری از عوامل خطربار برای ابتلا به افسردگی، محصول سطوح پایین تقویت مثبت است؟

- ۱. درمان مبتنی بر فعال سازی رفتاری
- ۲. شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی
- ۳. درمان رفتاری زناشویی
- ۴. روان درمانی بین فردی

۱۵- کدام گزینه درباره نشانه های منفی اختلال اسکیزوفرنی صحیح است؟

- ۱. لحن یکنواخت، سرد و بی روح بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی به نشانه بی تفاوتی اشاره دارد.
- ۲. افراد مبتلا به اسکیزوفرنی از لحاظ لذت انتظاری دچار کاستی هستند.
- ۳. دوستان محدود و علاقه ناچیز برای با دیگران بودن به افت عاطفی اشاره دارد.
- ۴. بی علاقگی یا ناتوانی ظاهری در تداوم فعالیتهای روزمره عادی به مردم گریزی اشاره دارد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشیه تحصیلی / کد درس:** روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۰۸۰ -، روانشناسی ۱۲۱۷۴۳۳

۱۶- تجارب ادراکی در غیاب هرگونه تحریک محیطی ذیربط چه نام دارد؟

۱. هذیان      ۲. آشفتگی ادراکی      ۳. توهمند      ۴. بی تفاوتی

۱۷- کدام گزینه درباره اختلال اسکیزوفرنی صحیح است؟

۱. رفتار درهم آمیخته و نشانه های منفی دست کم به مدت یک ماه وجود دارد.  
 ۲. عمدتاً دوره های مزمن اسکیزوفرنی با نشانه های منفی همراه هستند.  
 ۳. علائم اختلال دست کم ۶ ماه طول می کشد.  
 ۴. نشانه های مثبت ۱ تا ۴ ماه به شکل ضعیف تر وجود دارد.

۱۸- زنای با محارم در کدام دسته از اختلالات جنسی قرار میگیرد؟

۱. بچه بازی      ۲. آزار دوستی      ۳. عورت نمایی      ۴. مالشگری جنسی

۱۹- تحریک جنسی ناشی از علاقمندی به بخشهای غیرجنسی بدن مثل مو، ناخن و دست در کدام اختلال اتفاق می افتد؟

۱. مبدل پوشی      ۲. یادگارپرستی      ۳. بچه بازی      ۴. عورت نمایی

۲۰- کدام گزینه در DSM-5 دیگر اختلال به شمار نمی آید؟

۱. اختلال نعوظ      ۲. اختلال میل جنسی کم کار      ۳. اختمال بیزاری جنسی      ۴. انزال دیررس

۲۱- انزال زودرس در کدام دسته از اختلالات جنسی قرار می گیرد؟

۱. اختلال درد جنسی      ۲. اختلال های مربوط به میل جنسی      ۳. اختمال ارگاسم      ۴. اختمال زیاده دوست

۲۲- ویژگی دمانس کدام است؟

۱. معمولاً پیشرونده و بازگشت ناپذیر      ۲. نوسان نشانه ها در طی روز      ۳. مشکل در تمرکز و حفظ جریان تفکر      ۴. شروع وسیع

۲۳- مشکل شدید در توجه متمرکز و آشفتگی شدید در چرخه خواب و بیداری از نشانه های رایج کدام اختلال می باشد؟

۱. زوال عقل      ۲. هیپومانی      ۳. دلیریوم      ۴. زوال عقلی عروقی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشته تحصیلی / کد درس:** روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۴۳۳ - ۱۲۱۷۰۸۰

**۲۴- ترامپونما پالیدوم در بروز کدام زوال عقل نقش دارد؟**

- ۲. زوال عقل همراه با اجسام لوى
- ۴. زوال عقل پیشانی - گیجگاهی
- ۱. زوال عقل ناشی از بیماری
- ۳. زوال عقل عروقی

**۲۵- در زوال عقل پیشانی - گیجگاهی .....**

- ۱. همانند بیماری آلزایمر، حافظه تخریب شدیدی پیدا می کند.
- ۲. نسبت به بیماری آلزایمر، فرآیندهای عاطفی بطور عمیق آسیب نمی بیند.
- ۳. در مقایسه با آلزایمر، افراد مبتلا هیچ علامتی از خجالت و شرم‌سازی را در چهره نشان نمی دهند
- ۴. در مقایسه با افراد مبتلا به آلزایمر، افراد مبتلا، کاستیهای خاصی در توانایی تنظیم هیجانات ندارند.

**۲۶- در کدام بیماری، بافت مغز به شکلی بازگشت ناپذیر رو به تباہی می گذارد و در عرض ۱۲ سال بعد از شروع علائم، معمولاً بیمار میرد؟**

- ۱. دلیریوم
- ۲. دمانس
- ۳. زوال عقلی - عروقی
- ۴. آلزایمر

**۲۷- درمانجوي مبتلا به کدام اختلال شخصيت گرایش دارد تا مشکلات بین فردی خویش را وارد رابطه درمانی سازد؟**

- ۱. پسیکوپات
- ۲. خودشیفته
- ۳. نمایشی
- ۴. مرزی

**۲۸- نشانگان تایجین کیوفوشو با کدام اختلال شخصیت ارتباط دارد؟**

- ۱. اختلال شخصیت ضد اجتماعی
- ۲. اختلال شخصیت ضد اجتماعی
- ۳. اختلال شخصیت مرزی
- ۴. اختلال شخصیت اسکیزوفرنی گونه

**۲۹- در کدام اختلال شخصیت، اشخاص مبتلا درباره تواناییهای خویش نگاهی اغراق آمیز دارند و دائمًا در خیالات خود به موققیتهای عظیم دست می یابند؟**

- ۱. نمایشی
- ۲. وابسته
- ۳. خودشیفته
- ۴. وسواسی

**۳۰- به عقیده کوهات دو بعد فرزندپروری "سردی عاطفی و تاکید مفرط بر دستاوردهای کودک" موجب شکل گیری کدام اختلال شخصیت می شود؟**

- ۱. پارانویید
- ۲. خودشیفته
- ۳. اسکیزویید
- ۴. نمایشی

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	الف	عادی
2	ج	عادی
3	ب	عادی
4	د	عادی
5	ب	عادی
6	ج	عادی
7	ب	عادی
8	الف	عادی
9	د	عادی
10	الف	عادی
11	ج	عادی
12	ج	عادی
13	د	عادی
14	الف	عادی
15	ب	عادی
16	ج	عادی
17	ج	عادی
18	الف	عادی
19	ب	عادی
20	ج	عادی
21	ج	عادی
22	الف	عادی
23	ج	عادی
24	الف	عادی
25	ج	عادی
26	د	عادی
27	د	عادی
28	ب	عادی
29	ج	عادی
30	ب	عادی

**98-99-1**



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشیه تحصیلی / کد درس:** روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) ۱۲۱۷۰۸۰ - روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۴۳۳

- فرآیندی که متخصص بالینی از طریق آن با پیروی از سیستم مشخص شده ای به طبقه بندی خلاصه شده ای از نشانه های بیمار دست می یابد، چه می گویند؟

- ۱. تشخیص بالینی
- ۲. ارزیابی روانشناسی
- ۳. فرمول بندی بیماری
- ۴. پیش آگهی

- کدام مفهوم موقعیت جاری را توصیف می کند و فرضیه هایی را درباره اینکه چه چیزی فرد را وادار می کند تا به شیوه ناسازگارانه رفتار کند، ارائه می دهد؟

- ۱. فرمول بندی بیماری
- ۲. ارزیابی بالینی
- ۳. تدوین پویشی
- ۴. تشخیص

- کدامیک از موارد زیر، جزء آزمونهای فرافکن شخصیت است؟

- ۱. SCID
- ۲. آزمون میلیون
- ۳. آزمون MMPI
- ۴. آزمون رورشاخ

- به توصیف ذهنی بیمار و شکایتها یی که در مورد مشکلاتی که وجود دارد، چه می گویند؟

- ۱. سیر بیماری
- ۲. نشانه ها
- ۳. تشخیص
- ۴. اختلال

- کدامیک از گزینه های زیر در مورد اختلال افسردگی مداوم صحیح است؟

- ۱. این اختلال ادغام اختلال افسردگی اساسی مزمن و اختلال افسرده خوبی می باشد.
- ۲. خلق افسرده در بخش عمدۀ روز و در بیشتر روزها، حداقل به مدت دو ماه وجود دارد.
- ۳. در کودکان و نوجوانان خلق می تواند تحریک پذیر و مدت آن باید حداقل یک ماه باشد.
- ۴. نشانه ها ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی یا زمینه های دیگر ایجاد نمی کند.

- در کدام ویراست DSM، تغییرات نظری بیشتری در تفکر تشخیصی وارد شد؟

- ۱. DSM IV
- ۲. DSM IV T-R
- ۳. DSM 5
- ۴. DSM III

- سیستم طبقه بندی بین المللی بیماریها توسط چه نهادی چاپ شده است؟

- ۱. سازمان بهداشت جهانی
- ۲. انجمن روانشناسان آمریکا
- ۳. انجمن روانپزشکان آمریکا
- ۴. انجمن پژوهشگران آمریکا

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشیه تحصیلی / کد درس:** روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) ۱۲۱۷۰۸۰ - روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۴۳۳

-۸- کدام گزینه در مورد اختلالات اضطرابی صحیح است؟

۱. در DSM-5، اصطلاح روان رنجوری برای مجموعه های کوچکتر اختلالات اضطرابی که نشانه ها و ویژگی های واضح دارند، بکار می رود.
۲. افراد مبتلا به اختلال روان رنجور، افرادی گسیخته و خطرناک هستند و ارتباط آنان با واقعیت قطع شده است.
۳. در DSM-5 اختلال وسوس فکری-عملی در طبقه اختلالات اضطرابی قرار گرفته است.
۴. در DSM-III-Brخی اختلالات که نشانه های اضطراب آشکار را نداشتند، مجدداً بصورت اختلالات تجزیه ای یا جسمانی شکل طبقه بنده شدند.

-۹- در کدام دسته از اختلالات اضطرابی، افراد مبتلا عمدتاً دستخوش احساس کلی اضطراب و نگرانی پراکنده در این باره می شوند که ممکن است اتفاقات بالقوه ناگواری روی دهد؟

- |             |                 |                   |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| ۱. فوبی خاص | ۲. فوبی اجتماعی | ۳. اضطراب فraigir | ۴. اختلال وحشتزدگی |
|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|
- ۱۰- کدام ساختار مغز، به "مغز هیجانی" معروف است؟

- |            |             |                 |           |
|------------|-------------|-----------------|-----------|
| ۱. آمیگدال | ۲. هیپوکامپ | ۳. سیستم لیمبیک | ۴. بادامه |
|------------|-------------|-----------------|-----------|

-۱۱- قوی ترین عنصر درمان های موثر برای انواع اختلالات اضطرابی کدام است؟

۱. دارو درمانی
۲. مواجهه تدریجی با علائمی که فرد از آنها می ترسد.
۳. شناخت درمانی
۴. ترکیب دارو درمانی و رفتار درمانی

-۱۲- کدام گزینه در مورد افراد مبتلا به فوبی خون-تزریق و جراحت صحیح است؟

۱. این افراد همانند اغلب افراد مبتلا به فوبی در مواجهه با موضوع فوبیک، افزایش ضربان قلب و فشار خون نشان می دهند.
۲. این افراد برخلاف افراد مبتلا به فوبی، در مواجهه با موضوع فوبیک، ابتدا شتاب و بعد کاهش چشمگیر ضربان قلب و فشار خون دارند.

۳. این افراد، الگوی پاسخ فیزیولوژیکی منحصر به فرد را در مواجهه با همه موقعیتهای فوبیک نشان می دهند.
۴. این نوع فوبی تحت تاثیر محیط آموخته می شود.

-۱۳- "فردی که ترس خفیف از رانندگی را بعد از تصادفی جزئی اکتساب کرده است، اگر بعداً مود تهاجم جسمی قرار بگیرد، با اینکه در این تهاجم اتومبیلی وجود نداشته است، امکان دارد دچار فوبی تمام عیار شود" این تعریف ناظر بر کدام مفهوم است؟

- |                 |                    |                |             |
|-----------------|--------------------|----------------|-------------|
| ۱. فوبی رانندگی | ۲. اختلال وحشتزدگی | ۳. آگورا فوبیا | ۴. اثر تورم |
|-----------------|--------------------|----------------|-------------|

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشیه تحصیلی / کد درس:** روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) ۱۲۱۷۰۸۰ - روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۴۳۳

-۱۴- در روش درمان سرمشق گیری مشارکت کننده، تغییرات فعال سازی کدام ناحیه مغزی که در هیجان ترس درگیر است، میانجی یادگیری جدید می شود؟

۱. بادامه ۲. آمیگدال ۳. هیپوکامپ ۴. سیستم لیمبیک

-۱۵- کدام دارو می تواند اثربخشی درمان مواجه سازی برای ترس از ارتفاعات را در محیط واقعیت مجازی افزایش دهد؟

۱. فلئوکستین ۲. آمی تریپ تیلین ۳. دی-سیکلوسرین ۴. سرتالین

-۱۶- مهمترین متغیر خلق و خو در اختلال فوبی اجتماعی..... است که با ویژگی های شخصیتی ..... ویژگی های مشترکی دارد؟

۱. کمرویی- روان رنجوری و درون گرایی ۲. بازداری رفتاری- روان پریشی و برون گرایی ۳. فعال سازی رفتاری- وظیفه شناسی و برون گرایی ۴. کمرویی- درون گرایی و وظیفه شناسی

-۱۷- نشانه های کدام اختلال زیر شبیه نشانه های حمله وحشتزدگی است ولی ممکن است به گریه افتادن، خشم و فریاد کشیدن کنترل ناپذیر را شامل شود؟

- taijin kyofusho . ۲. ataque de nervios . ۱.  
aphonia . ۴. koro . ۳.

-۱۸- احساس قلنگی در گلو چه نام دارد؟

۱. هسیتری ۲. تمارض ۳. لالی حنجره ای ۴. گلوله هسیتریایی

-۱۹- کدام گزینه در مورد تمارض صحیح است؟

۱. نشانه های جسمانی یا روانی بطور عمده تولید نمی شوند و فرد خود را قربانی نشانه های خویش احساس می کند.  
۲. مشوق های بیرونی مثل اجتناب از کار یا به دست آوردن غرامت مالی فرد را برانگیخته می کند.  
۳. هدف فرد از ایجاد نشانه های جسمانی یا روانی به دست آوردن منافع شخصی نمی باشد.  
۴. فرد عمداً بصورت مخفیانه فیزیولوژی خود را تغییر می دهد تا بیماریهای مختلف را شبیه سازی کند.

-۲۰- نشانگان "اعتیاد بیمارستان" یا "بیمار حرفه ای" به کدام اختلال اطلاق می شود؟

۱. اختلال درد ۲. نشانگان مونچاوزن ۳. اختلال جسمانی کردن ۴. اختلال تبدیلی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشته تحصیلی / کد درس:** روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) ۱۲۱۷۰۸۰ - روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۴۳۳

۲۱- نشانه های کدام اختلال به عقیده فروید، جلوه ای از انرژی جنسی سرکوب شده هستند که بیمار را تهدید به هشیار شدن می کنند؟

- ۱. اختلال هسیتری تبدیلی
- ۲. اختلال اضطراب بیماری
- ۳. اختلال جسمانی کردن
- ۴. اختلال خودبیمارانگاری

۲۲- در خصوص نحوه شکل گیری هویت تجزیه ای، کدام نظریه معتقد است که این اختلال زمانی ایجاد می شود که فرد بسیار تلقین پذیر یاد می گیرد نقش های هویت های چندگانه را اختیار کرده و اجرا کند، به این دلیل که متخصصان بالینی ناخواسته آن ها را مجاز می شمارند و تلقین می کنند؟

- ۱. نظریه روان پویشی
- ۲. نظریه اجتماعی-شناختی
- ۳. نظریه پس از آسیب
- ۴. نظریه یادگیری

۲۳- به حالتی که در آن، فرد دستخوش دگرگونی چشمگیر موقتی در حالت هشیاری یا هویت شده باشد، اما هویت فرعی یا متناوب جایگزین نشده باشد، چه می گویند؟

- ۱. یادزدودگی پس گستر
- ۲. مسخ شخصیت
- ۳. آموک
- ۴. خلسه

۲۴- ناتوانی جزئی یا کامل در نگهداشت اطلاعات جدید چه نام دارد؟

- ۱. یادزدودگی پس گستر
- ۲. یادزدودگی پیش گستر
- ۳. یادزدودگی تجزیه ای
- ۴. گریز تجزیه ای

۲۵- این موضوع که انتظار داریم افراد به شیوه های خاصی رفتار کنند و رفتار نامتعارف را نابهنجار می دانیم، به کدامیک از ملاک های تشخیص رفتار نابهنجار اشاره دارد؟

- ۱. انحراف آماری
- ۲. خطرناک بودن
- ۳. غیرمنطقی و غیرقابل پیش بینی بودن
- ۴. ناسازگاری

۲۶- کشتن شرافتمندانه که به موجب آن، زن توسط یک خویشاوند مرد کشته می شود زیرا به صورت فردی که موجب آبروریزی خانواده شده است، درنظر گرفته می شود، چه نام دارد؟

- ۱. karo-kair .۴
- ۲. moro .۳
- ۳. amok .۲
- ۴. taijin kyofusho .۱

۲۷- این موضوع که از تعداد افرادی که در هر لحظه از زندگی خود به اختلال خاصی مبتلا بوده اند، برآورده به دست آوریم، ناظر بر کدام مفهوم است؟

- ۱. شیوع نقطه ای
- ۲. شیوع در طول عمر
- ۳. همه گیرشناسی
- ۴. بروز

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشیه تحصیلی / کد درس:** روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) ۱۴۰۸۰ - روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۴۳۳

-۲۸- برای توصیف وجود دو یا تعداد بیشتری اختلال در فرد واحد از چه اصطلاحی استفاده می شود؟

۱. تشخیص      ۲. پیش آگهی      ۳. سبب شناسی      ۴. همزمانی اختلالات

-۲۹- تحقیقاتی که در آنها موضوع واقعی مورد نظر را که انسان است، بررسی نمی کنیم، بلکه نزدیک به آن مثل حیوانات را بررسی می نماییم، چه نام دارد؟

۱. تحقیق قیاسی      ۲. تحقیق آزمایشی      ۳. تحقیق همبستگی      ۴. تحقیق موردنی

-۳۰- این موضوع که هر شرکت کننده در تحقیق، برای قرار گرفتن در گروه درمان یا بدون درمان، فرصت برابر دارد، ناظر بر کدام مفهوم است؟

۱. لیست انتظار      ۲. اعتبار پژوهش      ۳. پایایی پژوهش      ۴. گمارش تصادفی

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
۱	الف	عادی
۲	ج	عادی
۳	د	عادی
۴	ب	عادی
۵	الف	عادی
۶	ج	عادی
۷	الف	عادی
۸	د	عادی
۹	ج	عادی
۱۰	ج	عادی
۱۱	ب	عادی
۱۲	ب	عادی
۱۳	د	عادی
۱۴	الف	عادی
۱۵	ج	عادی
۱۶	الف	عادی
۱۷	الف	عادی
۱۸	د	عادی
۱۹	ب	عادی
۲۰	ب	عادی
۲۱	الف	عادی
۲۲	ب	عادی
۲۳	د	عادی
۲۴	ب	عادی
۲۵	ج	عادی
۲۶	د	عادی
۲۷	ب	عادی
۲۸	د	عادی
۲۹	الف	عادی
۳۰	د	عادی

**97-98-2**



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشیه تحصیلی / کد درس:** روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) ۱۲۱۷۰۸۰ - روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۴۳۳

- کدام آزمون برای ارزیابی نوروپسیکولوژیکی مناسب است؟

۱. آزمون MMPI-2      ۲. آزمون میلون ۳      ۳. آزمون T.A.T      ۴. آزمون هالستید-ریتان

- هنگامی که رفتار یا عملکرد یک فرد واحد در طول زمان بررسی می‌گردد از کدام روش استفاده شده است؟

۱. روش آزمایشی حقیقی      ۲. روش همبستگی      ۳. روش تحلیل عامل      ۴. روش پژوهش موردنی

- با استفاده از کدام روش می‌توان اندازه ارتباط بین دو متغیر را مستقل از حجم نمونه بررسی نمود؟

۱. فرا تحلیل      ۲. اندازه اثر      ۳. همبستگی پیرسون      ۴. سطح آلفا

- با استفاده از کدام روش می‌توان ناحیه خاصی از مغز را به مدت چند ثانیه از خط خارج کرده و پیامدهای رفتاری آنرا ارزیابی نمود؟

۱. FMRI      ۲. EEG      ۳. PET      ۴. TMS

- به تعداد موارد جدید اختلال که در دوره زمانی معین دیده می‌شود، چه می‌گویند؟

۱. همه گیرشناسی      ۲. شیوع نقطه ای      ۳. شیوع در طول عمر      ۴. میزان بروز

- در کدامیک از روش‌های مصاحبه محتواهی سوالات مصاحبه تحت تاثیر عادت‌ها یا دیدگاه‌های نظری مصاحبه گر قرار دارد؟

۱. مصاحبه‌های ارزیابی ساخت دار      ۲. مصاحبه‌های ارزیابی بی‌ساخت

۳. مصاحبه‌های انگیزشی      ۴. مصاحبه‌های شغلی

- کدام آزمون جزء آزمون‌های شخصیت فرافکن است؟

۱. MMPI      ۲. میلون ۳      ۳. NEO      ۴. رورشاخ

- کدام عبارت در خصوص DSM-5 صحیح است؟

۱. در DSM-5 به مسائل فرهنگی و اجتماعی کمتر توجه شده است.

۲. در DSM-5 تعداد اختلالات روانی تشخیص داده شده به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.

۳. اغلب طبقات تشخیصی در DSM-5 شامل انواع فرعی و شاخص‌هایی می‌شوند که به متخصصان امکان تشخیص برای دسته‌بندی فرعی را می‌دهند.

۴. هر سه مورد صحیح است.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشیه تحصیلی / کد درس:** روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) ۱۲۱۷۰۸۰ - روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۴۳۳

- ۹- کدام روش معاینه عصب شناختی امکان تشخیص دادن همبسته های عصبی برای تفکر عیب جویی از خود را فراهم می کند؟

EEG . ۴

MRI . ۳ کارکردی

MRI . ۲

PET . ۱

- ۱۰- منظور از "تدوین پویشی" ....

۱. بکارگیری روش آزمون و مصاحبه برای تشخیص یک اختلال است.
۲. بکارگیری روش تداعی آزاد و تفسیر رویا برای تشخیص یک اختلال است.
۳. بکارگیری اطلاعات گوناگون و اغلب متضاد درباره صفات شخصیت، الگوهای رفتاری و محیطی در تصویری منسجم و معنادار است.
۴. بکارگیری اطلاعات گوناگون از طریق روش روانکاوی برای چرایی پیدایش یک اختلال است.

- ۱۱- کدام اختلال با تشخیص غربی فوبی اجتماعی ارتباط دارد؟

taijin kyofusho . ۲

amok . ۴

koro . ۱

ataque de nervios . ۳

- ۱۲- در خصوص اختلال وسواس کدام عبارت صحیح است؟

۱. شواهد جدید نشان می دهند در این اختلال افزایش فعالیت سروتونین و حساسیت بیشتر ساختارهای مغز نسبت به سرتونین دخالت دارد
۲. شواهد جدید نشان می دهند در این اختلال کاهش فعالیت سروتونین و حساسیت کمتر ساختارهای مغز نسبت به سرتونین دخالت دارد
۳. شواهد جدید نشان می دهند در این اختلال افزایش فعالیت دوپامین و حساسیت بیشتر ساختارهای مغز نسبت به دوپامین دخالت دارد
۴. شواهد جدید نشان می دهند در این اختلال کاهش فعالیت دوپامین و حساسیت کمتر ساختارهای مغز نسبت به دوپامین دخالت دارد

- ۱۳- کدام عبارت صحیح است؟

۱. در اختلال اضطراب فراگیر کمبود کارکردی در GABA وجود دارد.
۲. در اختلال اضطراب فراگیر بیش کارکردی در GABA وجود دارد.
۳. در اختلال اضطراب فراگیر ترشح کورتیزول پایین است.
۴. در اختلال اضطراب فراگیر کمبود کارکردی در اپی نفرین وجود دارد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشته تحصیلی / کد درس:** روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) ۱۲۱۷۰۸۰ - روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۴۳۳

۱۴- کدام ساختار مغز در حملات وحشت زدگی نقش مهمتری دارد؟

۱. بادامه ۲. لوکوس سرلئوس ۳. قشر پیش پیشانی ۴. هیپوکامپ

۱۵- DSM-5 برای تشخیص اختلال آگورافوبی وجود علایم را حداقل برای چه مدتی ضروری می‌داند؟

۱. یک ماه ۲. دو هفته ۳. شش ماه ۴. سه ماه

۱۶- نشانه‌های شناختی اختلال وحشت زدگی شامل کدام موارد می‌شود؟

۱. مسخ شخصیت و مسخ واقعیت-ترس از مردن-ترس از دیوانه شدن و از دست دادن کنترل.  
۲. ترس از مردن-ترس از دیوانه شدن و از دست دادن کنترل-از دست دادن حافظه و هوشیاری  
۳. از دست دادن حافظه و هوشیاری-مسخ واقعیت-افکار وسوسی  
۴. از دست دادن حافظه و هوشیاری-مسخ شخصیت و اختلال یادگیری-افکار وسوسی

۱۷- دو ویژگی ادراک کنترل ناپذیری و پیش‌بینی ناپذیری از عوامل علیتی کدام اختلال محسوب می‌شوند؟

۱. وسوس فکری و عملی ۲. فوبی اجتماعی ۳. فوبی‌های خاص ۴. PTSD

۱۸- رفتار درمانی مبتنی بر روش مواجه سازی برای درمان کدامیک از اختلالات زیر بهترین نتایج را داشته است؟

۱. فوبی‌های خاص ۲. وسوس فکری و عملی ۳. اختلال اضطراب فراغیر

۱۹- در DSM-5 برای تشخیص فوبی خاص علایم چه مدت باید دوام داشته باشند؟

۱. یک ماه ۲. دو هفته ۳. سه ماه ۴. شش ماه

۲۰- در اختلالات اضطرابی کدامیک مواد انتقال دهنده عصبی بیشتر از همه درگیر هستند؟

۱. دوپامین-آدرنالین-نورادرنالین ۲. دوپامین-سرتونین-اپی‌نفرین ۳. اسید گاما آمینوبوتیریک-دوپامین-اسید گاما آمینوبوتیریک

۲۱- آمیزه پیچیده‌ای از هیجان‌های ناخوشایند و شناخت‌هایی که بیشتر به آینده گرایش دارند، تعریف ..... است.

۱. ترس ۲. اضطراب ۳. فوبی ۴. وسوس

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشیه تحصیلی / کد درس:** روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) ۱۲۱۷۰۸۰ - روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۴۳۳

-۲۲- زمانی که رویدادی تجزیه‌ای به رفتار خشونت آمیز، پرخاشگرانه یا آدم کشی منجر شود که به سمت افراد دیگر یا اشیا هدایت شده باشد، با چه اختلالی روبه رو هستیم؟

Taijin kyofusho . ۲

۱. اختلال AMOK

ataque de nervios . ۴

۳. اختلال شخصیت ضد اجتماعی

-۲۳- به طور معمول برای درمان اختلالات هویت تجزیه‌ای از کدام روش استفاده می‌گردد؟

۱. روش دارودرمانی و تحریک مغناطیسی مکرر از طریق جمجمه

۲. روش رفتاردرمانی و کنترل محیط

۳. روش روان پویشی و بینش گرا

۴. روش گشتالت درمانی پرلز

-۲۴- در اختلال یادزدودگی تجزیه‌ای نوع یادزدودگی به طور معمول از کدام نوع است؟

۲. یادزدودگی پس گستر

۱. یادزدودگی پیش گستر

۴. یادزدودگی مقطوعی

۳. یادزدودگی گذرا

-۲۵- گروهی از اختلالات که با آشفتگی‌های جدی در هوشیاری، حافظه، هویت یا ادراک شخص را شامل می‌شوند اختلالات ..... می‌گویند.

۴. اختلالات تجزیه‌ای

۳. اختلالات ساختگی

۲. اختلالات تبدیلی

۱. اختلالات سایکوزی

-۲۶- برای متمایز ساختن اختلالات تبدیلی از سایر اختلال‌های عصب شناختی واقعی به چه معیارهایی می‌توان توجه داشت؟

۱. ماهیت گزینشی این اختلالات و تاثیر پذیری آنها از هیپنوتیزم

۲. طول دوره این اختلالات و تاثیر پذیری از مصرف داروها

۳. همراهی این اختلالات با نفایض جدی حسی و حرکتی

۴. تمام موارد

-۲۷- نظریه فروید پیرامون علت اختلال هیستری تبدیلی در خصوص کدام عامل بود؟

۲. استفاده بیش از حد از مکانیسم‌های دفاعی

۱. تعارض پایگاه شخصیت نهاد با من

۴. امیال جنسی سرکوب شده

۳. امیال پرخاشگرانه سرکوب شده

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشیه تحصیلی / کد درس:** روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) ۱۲۱۷۰۸۰ - روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۴۳۳

-۲۸- در بین عوامل علیتی برای اختلال خودبیمارانگاری کدام دیدگاه مقبولیت بیشتری دارد؟

- ۱. دیدگاه روانکاوی
- ۲. دیدگاه زیستی
- ۳. دیدگاه شناختی- رفتاری
- ۴. دیدگاه زیستی- عصبی

-۲۹- کدام اختلال در DSM-5 به عنوان اختلال جدید مطرح شده است؟

- ۱. خودبیمار انگاری
- ۲. اختلال درد
- ۳. اختلال جسمانی کردن
- ۴. اختلال اضطراب بیماری

-۳۰- وجه تمایز اختلال ساختگی با تمارض در این است که.....

- ۱. در اختلال ساختگی پاداش های مادی بیرونی وجود ندارد.
- ۲. در تمارض پاداش های مادی بیرونی وجود ندارد.
- ۳. طول دوره علایم در اختلال ساختگی کوتاه تر است.
- ۴. تمارض یک خصلت مرتبط با اختلالات اضطرابی است.

**1217433 - 97-98-2**

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
۱	د	عادی
۲	د	عادی
۳	ب	عادی
۴	د	عادی
۵	د	عادی
۶	ب	عادی
۷	د	عادی
۸	ج	عادی
۹	ج	عادی
۱۰	ج	عادی
۱۱	ب	عادی
۱۲	الف	عادی
۱۳	الف	عادی
۱۴	الف	عادی
۱۵	ج	عادی
۱۶	الف	عادی
۱۷	ب	عادی
۱۸	الف	عادی
۱۹	د	عادی
۲۰	د	عادی
۲۱	ب	عادی
۲۲	الف	عادی
۲۳	ج	عادی
۲۴	ب	عادی
۲۵	د	عادی
۲۶	الف	عادی
۲۷	د	عادی
۲۸	ج	عادی
۲۹	د	عادی
۳۰	الف	عادی

**97-98-1**



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشیه تحصیلی / کد درس:** روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) ۱۲۱۷۰۸۰ - رو انسناسی، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۴۳۳

۱- انباست خانوادگی به چه چیزی می پردازد؟

۱. آیا اختلال در خانواده ها جریان دارد؟

۲. چگونه رفتار نابهنجار بررسی می شود؟

۳. میزان نابهنجاری رفتاری در کل جمعیت چقدر است؟

۴. با چه روش‌هایی رفتار نابهنجار مشخص و طبقه بندی می شود؟

۲- "نوعی کشتن شرافتمدانه که به موجب آن، زن توسط یک خویشاوند کشته می شود زیرا به صورت فردی که موجب آبروریزی خانواده شده است، درنظر گرفته می شود" چه نام دارد؟

Karo-kair . ۲

taijin kyofusho . ۱

Moro . ۴

Ataque de nervios . ۳

۳- در DSM-5، نشانگانی که اختلال بالینی قابل ملاحظه ای را در رفتار، تنظیم هیجان یا عملکرد شناختی فرد، ایجاد می کند، چه نام دارد؟

۴. طبقه بندی

۳. اختلال روانی

۲. تشخیص

۱. نابهنجاری

۴- کدامیک از اصطلاحات زیر برای توصیف وجود دو یا تعداد بیشتری اختلال در فرد واحد مورد استفاده قرار می گیرد؟

۴. همزمانی اختلالات

۳. شیوع

۲. بروز

۱. همه گیرشناسی

۵- کدامیک از گزینه های زیر به ضعف های روش مورد پژوهی اشاره دارد؟

۲. تعمیم پذیری زیادی دارند.

۱. سوگیری دارند.

۴. بر رابطه علی- معلولی تاکید دارند.

۳. منبع بالارزشی برای ارائه عقاید جدید هستند.

۶- جهت بررسی فعالیت مغز و بررسی جریان خون به بخش های مختلف مغز در طول انجام تکالیف، چه روشی مناسب است؟

MRI . ۴

CAT . ۳

TMS . ۲

FMRI . ۱

۷- واکنش انسان به رویدادهای استرس زای غیرقابل کنترل که در آن، رفتار فرد بر محیط او هیچ تاثیری ندارد و باعث می شود که وی درمانده و منفعل شود، چه نام دارد؟

۴. فوبی

۳. افسردگی نامیدی

۲. نامیدی

۱. اضطراب

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشیه تحصیلی / کد درس:** روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) ۱۲۱۷۰۸۰ - رو انسناسی، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۴۳۳

-۸- روشی که متخصص بالینی به وسیله آن، با استفاده از آزمون های روانشناختی، مشاهده و مصاحبه ها، خلاصه ای از نشانه ها و مشکلات درمانجو را تهیه می کند، چه نام دارد؟

- ۱. تشخیص بالینی
- ۲. ارزیابی روانشناختی
- ۳. ارزیابی روانی-اجتماعی
- ۴. مشاهده بالینی رفتار

-۹- کدامیک از آزمون ها، توانایی آزمودنی را در یادگیری و یادآوری مواد ارزیابی می کند و می تواند سرخ هایی را به قضاوت و تکانشگری او تامین کند؟

- ۱. آزمون عملکرد لامسه ای
- ۲. آزمون مقوله ای هالستید
- ۳. آزمون ریتم
- ۴. آزمون درک صدای گفتاری

-۱۰- کدامیک از روش های مشاهده بالینی رفتار، کمک بالارزشی برای مشخص کردن انواع موقعیت هایی است که رفتار ناسازگارانه در آنها برانگیخته می شود و به خودی خود فایده درمانی دارد؟

- ۱. ایفای نقش
- ۲. مقیاس های درجه بندی
- ۳. زیرنظر گرفتن خود
- ۴. مشاهده مستقیم

-۱۱- به توصیف های ذهنی بیمار و شکایتهایی که او در مورد اشکالی که وجود دارد، مطرح می کند، چه می گویند؟

- ۱. تشخیص
- ۲. بیماری روانی
- ۳. علائم
- ۴. نشانه ها

-۱۲- در کدامیک از آزمونهای زیر از لکه های جوهر، جهت ارزیابی شخصیت استفاده می شود؟

- ۱. آزمون اندریافت موضوع
- ۲. آزمون وکسلر
- ۳. آزمون تکمیل جمله
- ۴. آزمون رورشاخ

-۱۳- از ویژگی های افراد مبتلا به اختلالات روان رنجور کدام است؟

- ۱. رفتارهای ناسازگارانه و محکوم به شکست دارند.
- ۲. افرادی گسیخته و خطرناک هستند.
- ۳. ارتباط آنها با واقعیت قطع شده است.
- ۴. به دلیل تعارض محیطی، اضطراب قابل ملاحظه ای را تجربه می کنند.

-۱۴- کدامیک از گزینه های زیر، جزء اختلالات اضطرابی نمی باشد؟

- ۱. اختلال فوبی خاص
- ۲. اختلال اضطراب اجتماعی
- ۳. اختلال اضطراب فراگیر
- ۴. اختلال وسواس فکری-عملی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشیه تحصیلی / کد درس:** روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) ۱۲۱۷۰۸۰ - رو انسناسی، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۴۳۳

- ۱۵- آمادگی برای تجربه کردن حالت‌های خلقی منفی که عامل خطر رایج در اختلالات اضطرابی و خلقی است، کدام صفت می‌باشد؟

۱. برونگرایی
۲. درونگرایی
۳. روان پریشی
۴. روان رنجورخوبی

- ۱۶- حملات غیرمنتظره مکرر و نگرانی در مورد داشتن حمله‌ای دیگر یا پیامدهای داشتن حمله حداقل به مدت یک ماه، از نشانه‌های کدام اختلال می‌باشد؟

۱. اختلال وحشتزدگی
۲. اختلال فوبی اجتماعی
۳. اختلال وسواس فکری-عملی
۴. اختلال فوبی خاص

- ۱۷- کدامیک از تبیین‌های شناختی زیر در مورد اختلال فوبی، صحیح می‌باشد؟

۱. افراد مبتلا انتظار دارند که دیگران آنها را طرد یا به صورت منفی ارزیابی خواهند کرد.
۲. افراد مبتلا نسبت به احساس بدئی خود خیلی حساسند.
۳. افراد مبتلا گرایش دارند که معنی احساس‌های بدئی خود را فاجعه‌آمیز تلقی کنند.
۴. افراد مبتلا، اضطراب انتظاری و گاهی ترس‌های آگورافوبیک را تجربه می‌کنند.

- ۱۸- بهترین درمان رفتاری برای فوبی‌های خاص کدام است؟

۱. سرمشق گیری مشارکت کننده
۲. غرقه سازی
۳. مواجه سازی
۴. محیط‌های واقعیت مجازی

- ۱۹- چرا مردانی که دچار حملات وحشتزدگی می‌شوند، بیشتر مستعد مقاومت کردن در برابر آن هستند؟

۱. زیرا مردان بخاطر انتظارات اجتماعی رویکرد جسورانه تری به زندگی دارند.
۲. زیرا مردان نقشهای جنسیتی انعطاف ناپذیری دارند.
۳. زیرا اجتناب از موقعیتهایی که مردان از آنها می‌ترسد، در آنان کمتر است.
۴. زیرا هورمونهای مردانه مانع از ترسیدن آنان می‌شود.

- ۲۰- اولین حمله وحشتزدگی غالباً چه زمانی روی می‌دهد؟

۱. به هنگام ارتکاب جرم
۲. به هنگام از دادن رابطه‌ای مهم
۳. به هنگام تغییر شغل
۴. به هنگام برقراری ارتباط با فردی عزیز

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشیه تحصیلی / گد درس:** روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) ۱۲۱۷۰۸۰ -، رو انسناسی، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۴۳۳

**۲۱- منطقه اصلی درگیر در "شبکه ترس" در اختلال وحشتزدگی کجاست؟**

- ۱. اتصال بادامه با هیپوکامپ
- ۲. اتصال بادامه با مناطق پایین تر و مناطق بالاتر مغزی
- ۳. اتصال بادامه با سیستم لیمبیک مغز
- ۴. قشر پیش پیشانی

**۲۲- عبارت "به خرس های سفید فکر نکن" به کدامیک از عوامل شناختی موثر در بروز افکار وسواسی اشاره دارد؟**

- ۱. آمیختگی فکر-عمل
- ۲. سوگیری ها و تحریف های شناختی
- ۳. ارزیابی مسئولیت برای افکار مزاحم
- ۴. تلاش برای متوقف ساختن افکار وسواسی

**۲۳- موثرترین روش برای درمان اختلال وسواس فکری-عملی کدام است؟**

- ۱. کلومی پرامین
- ۲. غرقه سازی
- ۳. ترکیب مواجه سازی و جلوگیری از پاسخ
- ۴. فلوکستین

**۲۴- افرادی که اموالی را که به نظر بی فایده هستند یا ارزش کمی دارند را جمع می کنند و نمی توانند آنها را دور بریزنند و تا اندازه ای به اموال خود دلبستگی عاطفی دارند، به کدام اختلال مبتلا هستند؟**

- ۱. اختلال اضطرابی
- ۲. اختلال ذخیره کردن
- ۳. اختلال بدشکلی بدن
- ۴. اختلال شخصیت وسواسی

**۲۵- سربازی که عمداً نشانه های جسمانی را تولید و یا خیلی اغراق می کند و اجتناب از نظام وظیفه او را برانگیخته می کند، به کدام اختلال مبتلاست؟**

- ۱. اختلال تبدیلی
- ۲. تمارض
- ۳. اختلال ساختگی
- ۴. اختلال نشانه جسمانی

**۲۶- کدام دسته از بیماران، از ۳۳ نشانه مشخص شده، حداقل ۸ نشانه همچون ۴ نشانه درد، دو نشانه معدی-روده ای، یک نشانه جنسی و یک نشانه از نوع عصبی را گزارش می کند؟**

- ۱. اختلال درد
- ۲. خودبیمارانگاری
- ۳. اختلال جسمانی کردن
- ۴. اختلال اضطراب بیماری

**۲۷- گلوه هیستریایی یا احساس قلنگی در گلو از نشانه های کدام اختلال می باشد؟**

- ۱. اختلال جسمانی کردن
- ۲. اختلال ساختگی
- ۳. تمارض
- ۴. اختلال تبدیلی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشیه تحصیلی / کد درس:** روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) ۱۲۱۷۰۸۰ - رو انسناسی، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۴۳۳

-۲۸- در کدام اختلال افراد تجربه های مداوم یا مکرر احساس جدا بودن از بدن و فرآیندهای ذهنی خودشان را دارند و ممکن است احساس کنند بالای بدن خودشان شناور هستند؟

- ۱. اختلال مسخ شخصیت
- ۲. یادزدودگی تجزیه ای
- ۳. گریز تجزیه ای
- ۴. هویت تجزیه ای

-۲۹- کدام اختلال قبل از اختلال شخصیت چندگانه نامیده می شد؟

- ۱. اختلال تبدیلی
- ۲. اختلال مسخ واقعیت
- ۳. اختلال یادزدودگی تجزیه ای
- ۴. اختلال هویت تجزیه ای

-۳۰- امروزه نظریه عمدۀ درباره نحوه ای که اختلال هویت تجزیه ای ایجاد می شود، کدام نظریه است؟

- ۱. نظریه رفتاری
- ۲. نظریه پس از آسیب
- ۳. نظریه شناختی
- ۴. نظریه اجتماعی-شناختی

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
۱	الف	عادی
۲	ب	عادی
۳	ج	عادی
۴	د	عادی
۵	الف	عادی
۶	الف	عادی
۷	ج	عادی
۸	ب	عادی
۹	ب	عادی
۱۰	ج	عادی
۱۱	د	عادی
۱۲	د	عادی
۱۳	الف	عادی
۱۴	د	عادی
۱۵	د	عادی
۱۶	الف	عادی
۱۷	الف	عادی
۱۸	ج	عادی
۱۹	الف	عادی
۲۰	ب	عادی
۲۱	ب	عادی
۲۲	د	عادی
۲۳	ج	عادی
۲۴	ب	عادی
۲۵	ب	عادی
۲۶	ج	عادی
۲۷	د	عادی
۲۸	الف	عادی
۲۹	د	عادی
۳۰	ب	عادی

**96-97-2**



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشته تحصیلی / کد درس:** روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مشتمل گرا، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) ۱۴۰۸۰ - روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۴۰۳۳

- در کدام اختلال هدف فرد از بروز علایم به دست آوردن و نگهداشتن منافع از جمله توجه و نگرانی خانواده و پرسنل پزشکی است؟

۴. اختلال تبدیلی

۳. اختلال ساختگی

۲. اختلال تجزیه ای

۱. تمارض

- شایع ترین سن شروع خود بیمار انگاری کدام است؟

۲. اوایل نوجوانی

۱. اوایل کودکی دوره سوم

۴. اوایل بزرگسالی

۳. دوره سالمندی

- در DSM-5 کدام اختلال در طبقه اختلالات اضطرابی قرار نمی‌گیرد؟

۲. اختلال وحشت زدگی

۱. آگورافوبی

۴. وسواس فکری - عملی

۳. فوبی اجتماعی

- اشتغال ذهنی به داشتن بیماری جدی یا مبتلا شدن به آن؛ سطح بالای اضطراب در مورد سلامتی و اشتغال ذهنی به بیماری حداقل به مدت ۶ ماه اشاره به کدام اختلال دارد؟

۲. اختلال اضطراب بیماری

۱. هیپوکندریا

۴. اختلال جسمانی کردن

۳. اختلال درد مزمن

- نشانگان مونچاوزن عبارتند از.....

۱. نوع شدید و مزمن اختلال ساختگی همراه با نشانگان جسمانی

۲. نشانگان اختلال ساختگی همراه با وسواس

۳. نشانگان درد همراه با تمارض

۴. نشانگان PTSD همراه با آگورافوبیا

- در طبقه بندی مبتنی بر DSM-5، اختلال شخصیت چندگانه به چه عنوانی تغییر نموده است؟

۲. اختلال گریز تجزیه ای

۱. اختلال مسخ شخصیت

۴. اختلال هویت تجزیه ای

۳. اختلال شخصیت مرزی

- در مورد بیماران با اختلال هویت تجزیه ای رایج ترین روش های درمان بر مبنای کدام نظریه استوار است؟

۴. نظریه پس از آسیب

۳. نظریه شناختی

۲. نظریه انسانگرایی

۱. نظریه رفتاری

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشته تحصیلی/گد درس:** روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مشتمل گرا، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) ۱۲۱۷۰۸۰ - روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۴۳۳

-۸- کدام صفت شخصیتی با آمادگی ابتلا به اختلالات اضطرابی و خلقی همراه است؟

۱. برونگرایی      ۲. پذیرا بودن      ۳. روان رنجورخویی      ۴. مسولیت پذیری

-۹- کدام گزینه در خصوص فوبی‌ها صحیح است؟

۱. فوبی‌ها بیانگر دفاع علیه اضطرابی هستند که از تکانه‌های سرکوب شده نهاد ناشی می‌شود  
۲. فوبی‌ها حاصل رشد ناهمجارت فرمان هستند  
۳. فوبی‌ها ناشی از تثبیت در مراحل رشد روانی-جنسي هستند  
۴. فوبی‌ها ناشی از اختلال در روابط موضوعی هستند

-۱۰- روش درمانی مواجه سازی مبتنی بر واقعیت مجازی برای بهبود کدام اختلال پیشنهاد می‌گردد؟

۱. اختلال افسردگی اساسی      ۲. اختلال دوقطبی      ۳. فوبی‌های خاص      ۴. اسکیزوفرنی

-۱۱- ترس از حضور در خیابان‌ها و مکان‌های پر جمعیت؛ بازارهای خرید و فروشگاه‌ها و سینما‌ها توصیف کدام اختلال است؟

۱. فوبی اجتماعی      ۲. آگورافوبی      ۳. AMOK      ۴. GAD

-۱۲- در هنگام حملات وحشت زدگی کدام ساختار مغزی نقش فعال تری دارد؟

۱. بادامه      ۲. هیپوکامپ      ۳. رتیکولار      ۴. هسته‌های قاعده‌ای

-۱۳- در اختلال اضطراب فراگیر کمبود کارکرد کدام انتقال دهنده عصبی مطرح است؟

۱. کورتیزول      ۲. GABA      ۳. دوپامین      ۴. آدرنالین

-۱۴- رفتار تشریفاتی معمولاً در کدام اختلال مشاهده می‌گردد؟

۱. وسواس فکری-عملی      ۲. اضطراب فراگیر      ۳. اختلال ذخیره کردن      ۴. اختلال موکنی

-۱۵- نتایج اسکن‌های PET روی مغز بیماران وسواسی سطح بسیار بالای فعالیت در کدام مناطق مغزی را نشان می‌دهد؟

۱. قشر آهیانه‌ای      ۲. قشر پس سری      ۳. قشر گیجگاهی      ۴. قشر پیشانی

-۱۶- در درمان دارویی وسواس فکری-عملی عموماً از کدام دارو استفاده می‌گردد؟

۱. هالوپریدول      ۲. ریتالین      ۳. کلومی‌پرامین      ۴. آلپروزلام

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشته تحصیلی / کد درس:** روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) ۱۲۱۷۰۸۰ - روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۴۳۳

-۱۷- کدامیک از اختلالات زیر اختلال اضطرابی مرتبط با فرهنگ است؟

KORO . ۴

MDD . ۳

GAD . ۲

PTSD . ۱

-۱۸- کدام روش ارزیابی، در متمايز کردن تفاوت های ظریف در بافت نرم مغز توانایی برتری دارد؟

PET . ۴

CAT . ۳

MRI . ۲

EEG . ۱

-۱۹- با استفاده از کدام روش می توان اطلاعاتی در خصوص نحوه عملکرد یک اندام بدست آورد؟

MRI . ۴

EEG . ۳

PET . ۲

CAT . ۱

-۲۰- پرکاربردترین آزمون ارزیابی شخصیت کدام آزمون است؟

۴. میلیون

TAT . ۳

رورشاخ . ۲

MMPI-2 . ۱

-۲۱- برای نقشه برداری از فرایندهای شناختی در اختلالات روانی از کدام روش استفاده می گردد؟

۴. MRI کارکرده

CAT . ۳

PET . ۲

MRI . ۱

-۲۲- ترس چشمگیر از اینکه بدن فرد یا کارکردهای بدن ممکن است دیگران را ناراحت و شرمنده کند مربوط به کدام اختلال است؟

ASD . ۴

taijan kyofusho . ۳

koro . ۲

Ataque . ۱

-۲۳- به تعداد موارد جدیدی از اختلالات که در دوره زمانی معین یافت می شوند چه می گویند؟

۴. فراغیری

۳. درصد

۲. میزان شیوع

۱. میزان بروز

-۲۴- مهمترین ضعف روش مورد پژوهی کدام است؟

۲. علمی نیست.

۱. در معرض سوگیری است.

۴. جز نگر است.

۳. کارایی ندارد.

-۲۵- با کدام روش می توان بافت مغزی زیر بنایی را تحریک نمود؟

PET . ۴

CTSCAN . ۳

MRI . ۲

TMS . ۱

-۲۶- به قدرت تعمیم دهی نتایج ..... گفته می شود

۴. کنترل

۳. مقایسه

۲. اعتبار بیرونی

۱. اعتبار درونی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشیه تحصیلی / کد درس:** روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مشتمل گرا، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) ۱۴۰۸۰ - روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۴۳۳

-۲۷- کدامیک از صفات زیر در فوبی اجتماعی نقش دارد؟

- ۱. بروونگرایی
- ۲. بیش فعالی و پرتحرکی
- ۳. افسردگی
- ۴. بازداری رفتاری

-۲۸- در اختلال وحشت زدگی نشانگان حداقل چند ماه باید دوام داشته باشند؟

- ۱. ۳ ماه
- ۲. ۲ ماه
- ۳. ۱ ماه
- ۴. ۶ ماه

-۲۹- کدام اختلال در زنان تقریباً دو برابر شایع تر از زنان است؟

- ۱. داروهای ضد سایکوز
- ۲. PTSD
- ۳. ASD
- ۴. وحشتزدگی
- ۵. GAD

-۳۰- موثرترین داروهای درمان اختلال فوبی های اجتماعی کدام دسته دارویی است؟

- ۱. داروهای ضد افسردگی
- ۲. داروهای ضد افسردگی
- ۳. داروهای آرامبخش
- ۴. داروی ریسپریدون

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
۱	ج	عادی
۲	د	عادی
۳	د	عادی
۴	ب	عادی
۵	الف	عادی
۶	د	عادی
۷	د	عادی
۸	ج	عادی
۹	الف	عادی
۱۰	ج	عادی
۱۱	ب	عادی
۱۲	الف	عادی
۱۳	ب	عادی
۱۴	الف	عادی
۱۵	د	عادی
۱۶	ج	عادی
۱۷	د	عادی
۱۸	ب	عادی
۱۹	ب	عادی
۲۰	الف	عادی
۲۱	د	عادی
۲۲	ج	عادی
۲۳	الف	عادی
۲۴	الف	عادی
۲۵	الف	عادی
۲۶	ب	عادی
۲۷	د	عادی
۲۸	ج	عادی
۲۹	الف	عادی
۳۰	ب	عادی

**96-97-1**



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشیه تحصیلی/گد درس:** روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ۱۲۱۷۰۸۰ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۴۳۳

**۱- کدام گزینه نقطه ضعف طبقه بندی لحاظ نمی گردد؟**

۲. داغ ننگ

۱. کلیشه سازی

۴. نداشتن روایی لازم

۳. کوتاه کردن اطلاعات در خصوص افراد

**۲- کدام اختلال زیر در DSM-5 در طبقه اختلالات ویژه فرهنگ قرار گرفته است؟**

MMD . ۲

PTSD . ۱

ataque de nervios . ۴

GAD . ۳

**۳- با استفاده از کدام روش می توان بافت مغزی زیربنایی را تحریک نمود؟**

TMS . ۴

FMRI . ۳

PET . ۲

EEG . ۱

**۴- به درصد برآورد شده واقعی و جاری موارد اختلال در جمعیتی معین در هر لحظه از زمان اشاره دارد؟**

۴. میزان بروز

۳. همه گیر شناسی

۲. شیوع

۱. شیوع نقطه ای

**۵- نوعی روش آماری که اندازه اثر به دست آمده از تمام تحقیقات را محاسبه و بعد ترکیب می کند گفته می شود؟**

۴. فراتحلیل

۳. تحلیل عامل

۲. روش آزمایشی

۱. روش همبستگی

**۶- نظریه درمانگی آموخته شده افسردگی حاصل چه نوع پژوهش هایی بوده است؟**

۲. طرح های مورد منفرد

۱. پژوهش های همبستگی

۴. پژوهش های تاریخی

۳. پژوهش های حیوانی

**۷- واکنش فوبی مکان های بسته ممکن است در کدام روش ارزیابی عصب شناختی مشاهده گردد؟**

EEG . ۴

PET . ۳

CAT . ۲

MRI . ۱

**۸- مطابق پژوهش های لانگ و همکاران کدام روش تشخیصی جهت تشخیص همبسته های عصبی برای تفکر عیب جویی از خود موثر است؟**

CAT . ۴

PET . ۳

MRI . ۲

FMRI . ۱

**۹- کدام آزمون برای ارزیابی نوروساکولوژیکی کاربرد دارد؟**

۲. آزمون TAT

۱. آزمون MMPI

۴. آزمون هالستید- ریتان

۳. آزمون GHQ

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشته تحصیلی/گد درس:** روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ۱۲۱۷۰۸۰ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۴۳۳

۱۰- پرکاربردترین آزمون ارزیابی شخصیت کدام آزمون است؟

۴. آزمون TAT

۳. آزمون MMPI

۲. آزمون رورشاخ

۱. آزمون میلیون

۱۱- نرخ وقوع اختلال در زنان بالاتر از مردان است؟

۲. اختلال بی اشتہایی عصبی

۱. اختلال شخصیت ضد اجتماعی

۴. اختلال ptsd

۳. اختلال اسکیزوفرنی

۱۲- منظور از اختلالات روان رنجور کلاسیک کدام دسته از اختلالات است؟

۲. اختلالات اضطرابی - وسواس فکری و عملی

۱. اختلال وسواس - وحشت زدگی - فوبیا

۴. اختلال اضطراب فraigir - فوبیا - واسترس پس از سانحه

۳. اختلال فوبیا - افسردگی - اضطراب فraigir

۱۳- در DSM-5 طول دوره عالیم برای تشخیص فوبی خاص چند ماه در نظر گرفته شده است؟

۴. ۸ ماه

۳. ۱ ماه

۲. ۳ ماه

۱. ۶ ماه

۱۴- شروع کدام دسته از فوبی ها معمولاً در اوایل بزرگسالی و نوجوانی است؟

۲. فوبی دندانپزشکی

۱. فوبی جراحت و خون

۴. فوبی مکان های بسته و رانندگی

۳. فوبی تزریق

۱۵- شایع ترین نوع فوبی اجتماعی کدام است؟

۴. ترس از سخنرانی

۳. آگروفوبیا

۲. ترس از فروشگاه

۱. ترس از گروه

۱۶- بکارگیری کدام دارو به همراه روش درمان مواجه سازی در بهبود عالیم فوبی اجتماعی نتایج بهتری را رقم می زند؟

۴. دی سیکلوسین

۳. لیتیوم

۲. فلوکستین

۱. کلردیاز پوکساید

۱۷- افزایش فعالیت کدام منطقه مغز در حملات وحشت زدگی نقش بارزی ایفا می کند؟

۴. جسم پینه ای

۳. بیسال گنگلیا

۲. بادامه

۱. هیپوکامپ

۱۸- در دیدگاه روانکاوی کدام دسته از مکانیسم های دفاعی در اختلال اضطراب شناور به درستی عمل نمی کنند؟

۲. سرکوبی- درون فکنی

۱. دلیل تراشی - برون فکنی

۴. سرکوبی - جابجاگی

۳. همانند سازی - تصعید

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشته تحصیلی/گد درس:** روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ۱۲۱۷۰۸۰ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۴۳۳

۱۹- کدام انتقال دهنده عصبی عمیقا در اختلال اضطراب فraigیر درگیر است؟

۱. اسیدگاما آمینوبوتیریک (GABA)  
 ۲. سرتونین  
 ۳. ال دوپا  
 ۴. نوراپی نفرین

۲۰- در DSM-5 اختلال بد شکلی بدن در کدام طبقه قرار گرفته است؟

۱. اختلالات OCD  
 ۲. اختلالات اضطرابی  
 ۳. اختلالات شخصیت  
 ۴. اختلالات جسمانی و تجزیه ای

۲۱- در درمان دارویی اختلال وسوس فکری - عملی کدام دارو اثر بخش است؟

۱. هلوپریدول  
 ۲. لیتیوم  
 ۳. ایندرال  
 ۴. کلومی پرامین

۲۲- بیمار با علایم خود بیمارانگاری اکنون در DSM-5 در کدام طبقه قرار می گیرد؟

۱. اختلالات شخصیت  
 ۲. اختلالات اضطرابی  
 ۳. اختلالات تجزیه ای  
 ۴. اختلالات جسمانی و تجزیه ای

۲۳- کدام اختلال در زنان دو تا سه برابر بیشتر از مردان گزارش شده است؟

۱. اختلال تبدیلی  
 ۲. اختلال احتکار  
 ۳. اختلال موکنی  
 ۴. اختلال مانیک

۲۴- اشتغال ذهنی به داشتن بیماری جدی بدون نشانه های جسمانی و سطح بالای اضطراب در مورد سلامتی با طول دوره حداقل ۶ ماه از نشانگان کدام اختلال است؟

۱. هیپوکندریا  
 ۲. هیستروی  
 ۳. اختلال بدريختی  
 ۴. اختلال اضطراب بیماری

۲۵- نشانگان مونچاوزن برای توصیف کدام اختلال استفاده می گردید؟

۱. اختلالات تجزیه ای  
 ۲. اختلالات اضطرابی  
 ۳. اختلالات ساختگی  
 ۴. اختلالات خلقی

۲۶- وجود تجربه های غیر واقعی بودن؛ جدا بودن؛ یا مشاهده گربریونی بودن در رابطه با افکار؛ احساسات همراه با تغییرات ادراکی و درک زمان تحریف شده اشاره به کدام اختلال دارد؟

۱. اسکیزوفرنی  
 ۲. اختلال درد  
 ۳. اختلال مسخ واقعیت  
 ۴. اختلال مسخ شخصیت

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  
**وشته تحصیلی/گد درس:** روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ۱۲۱۷۰۸۰ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۴۳۳

۲۷- اصطلاح هویت مجری و هویت های فرعی مختص کدام اختلال است؟

- ۱. اختلال شخصیت چند گانه
- ۲. اختلال یادزدودگی پیش گستر
- ۳. اختلال یادزدودگی پس گستر
- ۴. اختلالات ساختگی

۲۸- شایع ترین اختلال همراه با اختلال هویت تجزیه ای کدام اختلال است؟

- ۱. اختلال مصرف مواد
- ۲. اختلال PTSD
- ۳. اختلال GAD
- ۴. اختلال MMD

۲۹- در مورد بیماران با اختلال هویت تجزیه ای رایج ترین روش های درمان مبتنی بر کدام نظریه استوار است؟

- ۱. نظریه شناختی - اجتماعی
- ۲. نظریه رفتاری
- ۳. نظریه روانکاوی
- ۴. نظریه پس از آسیب

۳۰- به فرایندی که متخصص بالینی از طریق آن با پیروی از سیستم مشخص شده ای مانند DSM5 به طبقه بندی خلاصه شده ای از نشانه ها می پردازد چه می گویند؟

- ۱. ارزیابی روانشناسی
- ۲. تشخیص بالینی
- ۳. ارزیابی
- ۴. تشخیص

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
۱	د	عادی
۲	د	عادی
۳	د	عادی
۴	الف	عادی
۵	د	عادی
۶	ج	عادی
۷	الف	عادی
۸	الف	عادی
۹	د	عادی
۱۰	ج	عادی
۱۱	ب	عادی
۱۲	ب	عادی
۱۳	الف	عادی
۱۴	د	عادی
۱۵	د	عادی
۱۶	د	عادی
۱۷	ب	عادی
۱۸	د	عادی
۱۹	الف	عادی
۲۰	ب	عادی
۲۱	د	عادی
۲۲	الف	عادی
۲۳	الف	عادی
۲۴	د	عادی
۲۵	ج	عادی
۲۶	د	عادی
۲۷	الف	عادی
۲۸	ج	عادی
۲۹	د	عادی
۳۰	ب	عادی