

" نحوه رقیق سازی و تجویز داروهای پرکاربرد در بخش ها "

نام دارو	نحوه رقیق سازی	سرعت تزریق	توجهات پرستاری
ونکوماپسین	با ۱۰۰ میلی لیتر سرم نرمال سالین در میکروست	حداقل طی یک ساعت	واکنش آنافیلاکسی و حساسیتی/ در صورت سرعت بالای تجویز عارضه سندرم مرد قرمز : افت BP، راش و گرگرفتگی در ناحیه گردن و شانه
سفترباکسون	با ۵۰-۱۰۰ میلی لیتر سرم نرمال سالین در میکروست	حداقل طی نیم ساعت	واکنش آنافیلاکسی و حساسیتی/ ایست قلبی تنفسی در صورت تزریق iv مستقیم!
کلیندامایسین	با ۱۰۰ میلی لیتر سرم نرمال سالین در میکروست	حداقل طی یک ساعت	واکنش آنافیلاکسی/ درد و ترومبوفلیت در ناحیه تزریق وریدی
جنتامایسین	با ۱۰۰ میلی لیتر نرمال سالین یا دکستروز ۵٪	طی ۳۰ الی ۶۰ دقیقه	عارضه نفروتوکسیسیته بصورت وزوز گوش، سرگیجه و کاهش شنوایی
مترونیدازول	یک ویال ۱۰۰ میلی لیتری آماده دارد. مترونیدازول ۰/۵٪	حداقل طی ۲۰ دقیقه	احساس طعم فلز در دهان / تهوع و استفراغ
پنتوپرازول	رقیق کردن با ۱۰ میلی لیتر آب مقطر	تزریق iv مستقیم طی حداقل ۲ دقیقه	سردرد، سرگیجه، بیخوابی، تهوع، استفراغ
اندانسترون	جهت iv مستقیم طی ۲ تا ۵ دقیقه بدون رقیق سازی/ جهت انفوزیون با ۵۰ الی ۱۰۰ میلی لیتر نرمال سالین	انفوزیون طی حداقل ۱۵ دقیقه	سردرد، یبوست، احساس گرما و فلاشینگ
دگزانتازون	وریدی مستقیم طی حداقل ۳ دقیقه انفوزیون با ۱۰۰ میلی لیتر نرمال سالین	به شکل deep Im هم قابل تزریق می باشد. انفوزیون طی حداقل ۱۵ دقیقه	واکنش آنافیلاکسی و حساسیتی
سفازولین (کفzol)	رقیق سازی با ۵-۱۰ میلی لیتر آب مقطر/ در صورت انفوزیون با ۵۰-۱۰۰ دکستروز ۵٪	طی ۳-۵ دقیقه iv مستقیم انفوزیون طی ۲۰-۳۰ دقیقه	تزریق سریع: تهوع و استفراغ، فلیت